

MUSEUM HEINEANUM.

Verzeichniss

der

ornithologischen Sammlung

des Oberamtmann

Ferdinand Heine

auf Gut St. Burchard vor Halberstadt.

Mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen Arten systematisch bearbeitet

von

Dr. Jean Cabanis,

erstem Custos der Königlichen zoologischen Sammlung zu Berlin

und

Ferdinand Heine,

Stud. philos.

III. Theil,

die

Schrillvögel

und die Zusammenstellung der Gattungen und Arten des 1—3. Theils *enthaltend.*

Halberstadt, 1860.

In Commission bei R. Frantz.

MUSEUM HEINEANUM.

Verzeichniss

der

ornithologischen Sammlung

des

Oberamtmann

Ferdinand Heine

auf

Gut St. Burchard

vor

Halberstadt.

Mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen Arten systematisch bearbeitet

von

Dr. Jean Cabanis,

erstem Custos der Königlichen zoologischen Sammlung zu Berlin

und

Ferdinand Heine,

Stud. philos.

III. Theil,

die

Schrillvögel

und die Zusammenstellung der Gattungen und Arten des 1–3. Theils enthaltend.

Halberstadt, 1860.

In Commission bei R. Frantz.

Museum
ORNITHOLOGICUM
HEINEANUM.

Pars III.

STRISORES.

ORDO III. STRISORES. SCHRILLVŒGEL.

TRIBUS I. MACROCHIRES. LANGFLUEGLER.

Fam. TROCHILIDÆ. Schwebevögel.

Subfam. POLYTMINÆ. Gnomen.

Gen. RHAMPHODON *) Less. 1831. —
Grypus Spix 1824 (nec Germar 1817).

1. 1. R. naevius Less.

Trait. p. 288. 1. — Jard. Humm. B. I. p. 75. t. 1. — Diezmann Colibr. p. 79. t. 1. — *Trochilus naevius* Dumont Dict. Sc. Nat. XXVII. p. 432. — Vieill. Enc. p. 548. 1. — Temm. Pl. col. 120. 3. — Licht. Doubl. p. 14. 117.— Less. Man. Orn. II. p. 74. — *Grypus ruficollis* Spix Av. Bras. I. p. 79. 1. t. 80. 3. — *Rhamphodon maculatum* Less. Colibr. p. 18. t. 1. — *Phaëthornis naevius* Jard. Humm. B. II. p. 152. 17. — *Grypus naevius* Gray List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 105. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 147.

---

*) Reichenbach erwähnt (Aufz. Colibr. p. 15) noch eine zweite Art dieser Gattung aus Mexico als *Rhampodon chrysurus* Rchb. 1852, es ist uns jedoch nicht gelungen, eine Beschreibung desselben aufzufinden. Dagegen gehört noch hierher die Gattung:

Eutoxeres Rchb. 1849 (*Myiaëtina* (!) Bp. 1854):

1. *E. aquila* Gould Mon. Troch. II. t. 5. — Scl. B. Bogot. p. 11. 63. — *Trochilus aquila* „Loddig." Bourc. P. Z. S. 1847. p. 42. — Id. R. Z. 1847. p. 254. — *Pelytmus aquila* Gray Gen. B. I. p. 108. 39. t. 36. — *Glaucis aquila* Bp. Consp. I. p. 67. gen. 148. 3. — *Myiaëtina aquila* Id. Consp. Troch. p. 2. gen. 2. 2 (Neugranada);
2. *E. Condaminei* Gould Mon. Troch. II. t. 6. — *Trochilus Condaminei* Bourc. Compt. Rend. 1851. p. 186. — Id. R. & Mag. Z. 1851. p. 96. — *Myiaëtina Condaminii* Bp. Consp. Troch. p. 2. gen. 2. 3 (Ecuador). —

1. — Gould Mon. Troch. III. t. 4. — Burm. Th. Bras. II. p. 320. — *Trochilus squamosus* Licht. in Mus. Berol. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. Glaucis Boie 1831. —

2. 1. G. hirsuta Gray

List Gen. B. p. 17. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 148. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 321. — Gould Mon. Troch. XI. t. 12. — *Polytmus brasiliensis* Briss. Av. II. p. 670. 3. — *Trochilus hirsutus* Gm. S. N. p. 490. 39. — Vieill. Enc. p. 556. 94. — Less. Colibr. p. 80. t. 21. — Id. Trait. p. 290. 11. — *Trochilus brasiliensis* Lath. Ind. Orn. I. p. 308. 23. — Burm. Th. Bras. II. p. 327. Anm. 2. — *Brin blanc femelle* Vieill. Ois. dor. I. p. 38. t. 18.— *Colibri à pieds vêtus* Id. l. l. I. p. 40. t. 20 & p. 122. t. 68. — *Trochilus dominicus* Licht. (nec Lin.) Doubl. p. 13. 110. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 197. — *Trochilus ferrugineus* Wied Beitr. IV. p. 120. 21. — *Trochilus superciliosus fem.* Less. Colibr. t. 6. — Id. Trait. p. 289. 2. — Jard. Humm. B. II. p. 120. t. 27. — Burm. Th. Bras. II. p. 324. Anm. 1. — *Trochilus Mazeppa* Less. Troch. t. 3. — Jard. Humm. B. II. p. 130. — *Phaëthornis hirsutus* Id. l. l. II. p. 151. 10.— Jard. & Selby Ill. Orn. III. t. 143.— *Phaëthornis Mazeppa* Jard. Humm. B. II. p. 152. 11. — *Polytmus hirsutus* Gray Gen. B. I. p. 108. 3. — *Polytmus Mazeppa* Id. l. l. I. p. 108. 32. — *Glaucis Mazeppa* Rchb. Aufz. Colibr. p. 15. —
Caracas *) — ♂; Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 5 St.

---

*) Eine sorgfältige Vergleichung des vorliegenden Exemplares aus Caracas, sowie der von Schomburgk in Guiana gesammelten des berliner Museums mit vielen brasilianischen Bälgen hat uns auch nicht den geringsten specifischen Unterschied zwischen denselben auffinden lassen, und glauben wir daher mit Burmeister, dass die grössere oder geringere Breite der weissen Spitzen der Steuerfedern lediglich auf sexueller oder Alters-Verschiedenheit beruht. Bogotensische Exemplare, welche sich nach Gould vorzüglich durch den grünlichen Anflug der Unterseite auszeichnen sollen, sind uns leider noch nicht zu Gesicht gekommen. Wirklich gute Arten scheinen indessen zu sein:

2. *G. Dohrni* Rchb. Aufz. Colibr. p. 15. — Gould Mon. Troch. XI. t 15. — *Trochilus Dohrni* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1852. p. 139 (Ecuador);

3. *G. Ruckeri* Gould Mon. Troch. II. t. 7. — *Trochilus Ruckeri* Bourc. P. Z. S. 1847. p. 46. — Id. R. Z. 1847. p. 259. — *Polytmus Ruckeri* Gray Gen. B. I. p. 108. 38. — *Threnetes Ruckeri* Rchb. Aufz. Colibr. p. 15 (Veragua). —

Gen. POLYTMUS Briss. 1760. —

Smaragdites Boie 1831. *Polytmus* Gray 1840. *Thaumatias* (!) Bp. 1849. *Smaragditis* Rchb. 1854. *Chrysobronchus* Bp. 1854. *Thaumantias* Id. 1854 (nec Eschh. 1829).

3. 1. P. thaumantias Gray

List Gen. B. p. 19 (nec Gen. B. I. p. 108. 40). — *Polytmus* Briss. Av. III. p. 667. 1. — *Trochilus thaumantias* Lin. S. N. p. 190. 8. — Lath. Ind. Orn. I. p. 309. 27. — ? *Colibri* Buff. Pl. enl. 600. 1. — *Oiseau-mouche à queue verte et blanche* Vieill. Ois. dor. I. p. 83. t. 41. — *Trochilus virescens* Dumont Dict. Sc. Nat. X. p. 49. — *Trochilus chrysobronchus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 287. — *Trochilus viridis* Vieill. N. D. VII. p. 354. — Id. Enc. p. 557. 38. — Jard. Humm. B. II. p. 141. 26. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 187. — *Ornismya viridis* Less. Ois. Mouch. p. 178. t. 60 (ad.). — Id. Troch. p. 144. t. 54 (jun.). — Id. Trait. p. 282. 44. — *Polytmus chrysobronchus* Gray Gen. B. I. p. 108. 52. — *Thaumatias albiventris p t.* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 1. — *Leucippus chrysobronchus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 781. 4816-17. — *Chrysobronchus virescens* Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 30. 108. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 13. — *Thaumantias Linnaei* Bp. (nec Gould) Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 245. — *Trochilus chloroleucurus* Saucerotte. —

Brasilien *) — ♂ ad.; Venezuela *) — 2 ♂ jun. — 3 St.

4. 2. P. Theresiae Nob.

Oiseau-mouche tout vert s. Trochilus viridissimus Vieill. (nec Gm.) Ois. dor. I. p. 84. t. 42. — Id. Enc. p. 572. 85. — *Trochilus virescens* Wied (nec Dumont) Beitr. IV. p. 107. 18. — *Ornismya viridis* Less. Troch. p. 96. t. 33 (nec Ois. Mouch. p. 178. t. 60). — *Trochilus Theresiae* Da Silva Mai. Minerv. Brasil. 1843. p. 2. — *Polytmus sp. p t.* Gray Gen. B. I. p. 108. 51. — *Amazilia viridissima* Bp. (nec

---

*) Die Exemplare aus Venezuela scheinen grösser und schlanker gebaut zu sein, und zeigen im Allgemeinen eine mehr grünliche, weniger gelbliche Färbung, mehr Grün im Schwanze und einen längern schlankern Schnabel. Wir messen an denselben: Ganze Länge 4″ 6‴, Fl. 2″ 4‴, Schwz. 1″ 8‴, Schnabelf. 1″; während brasilianische folgende Maassen ergeben: G. L. 4″ 2‴, Fl. 2″ 2‴, Schwz. 1″ 7‴, Schnabelf. 10‴. —

Gm.) Consp. I. p. 77. gen. 180. 4. — *Smaragditis viridissima* Rchb. (nec Gm.) Aufz. Colibr. p. 7. — *Chrysobronchus viridissimus* Bp. (nec Gm.) Consp. Troch. p. 5. gen. 30. 109. — *Chlorestes viridissimus* Rchb. (nec Gm.) Troch. Enum. p. 4. t. 695. 4547-48. — *Thaumatias viridissimus* Burm. (nec Gm.) Th. Bras. II. p. 344. 3. — *Thaumatias chrysurus* Id. (nec Less.) l. l. II. p. 345. 4. — *Trochilus viridicaudus* Saucerotte MSS. — *Chrysobronchus viridicaudus* Gould Mon. Troch. XVI. t. 14. — *Trochilus prasinus* Licht. in Mus. Berol. —

Para — ♂, ♀; Cayenne — ♀ — 3 St.

Gen. DOLERISCA *) Nob. —

Doleromyia (!) Bp. 1854. *Leucippus* Gray **) 1855 (nec Bp. 1849).

5. 1. **D. fallax** Nob.

Trochilus fallax Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. 44. — Id. R. Z. 1843. p. 103. — *Trochilus (Lampornis) fulviventris* Gould P. Z. S. 1846. p. 88. 11. — *Polytmus fallax* Gray Gen. B. I. p. 108. 55. — *Leucippus fallax* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 165. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 783. 4820-21. — Gould Mon. Troch. XII. t. 13. — *Doleromyia fallax* Bp. Consp. Troch. p. 2. gen. 5. 10. —

Venezuela — ♂ — 1 St.

Subfam. PHAËTHORNITHINÆ. Eremiten.

Gen. PYGMORNIS ***) Bp. 1854. —

Polytmus Tsch. 1844 (nec Briss. 1760). *Eremita* Rchb. 1854 (nec Coct. 1837).

6. 1. **P. pygmaea** Nob.

Trochilus pygmaeus Spix Av. Bras. I. p. 78. 1. t. 80. 1. —

*) Diminutivum von δολερός (= *fallax*). —

**) Mit Unrecht, glauben wir, betrachtet Gray (Catal. Gen. & Subgen. B. p. 21. 315) als Typus der Gattung *Leucippus* Bp. den *Trochilus fallax* Bourc.; denn obschon Bonaparte denselben voranstellt, scheint er ihn doch gar nicht gekannt zu haben, da der Name *Leucippus* zwar sehr gut auf *T. Turneri* Bourc. (*T. hypoleucus* Gould), durchaus aber nicht auf unsere Art, die keine Spur von Weiss zeigt, anwendbar ist. —

***) Gray betrachtet (Catal. Gen. & Subgen. B. p. 130. 297c) den *Trochilus intermedius* Less. als Typus der Gattung *Pygmornis* (!) Bp, wie es uns scheint, mit grossem Unrecht; denn Bonaparte stellt diese Art nicht etwa desswegen an die Spitze,

Burm. Th. Bras. II. p. 327. Anm. 1. — *Phaëthornis pygmaeus* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 13. — Gould Mon. Troch. IV. t. 13. — *Eremita pygmaeus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

7. 2. P. eremita Nob.

Trochilus brasiliensis Temm. (nec Lath.) Pl. col. 120. 2. — Wied Beitr. IV. p. 111. 19. — Less. Man. Orn. II. p. 75.— Id. Trait. p. 289. 4. — *Trochilus rufigaster* (!) Id. (nec Vieill.) Colibr. p. 43. t. 9. — Jard. Humm. B. II. p. 83.

---

weil er sie für die eigentlich typische hält, sondern gerade aus dem entgegengesetzten Grunde, weil sie als die grösste und desshalb am wenigsten typische den Uebergang zu den bereits aufgezählten grossen Phaëthornithen bilden soll. Indessen würde *T. intermedius* doch besser bei *Phaëthornis* zu belassen sein, und fallen somit nach Ausscheidung desselben *Eremita* Rchb. und *Pygmornis* Bp. völlig zusammen. — Ausser den drei oben aufgezählten werden hierher noch folgende Arten zu stellen sein.

4. *P. episcopus.* — *Phaëthornis episcopus* Gould P. Z. S. 1857. p. 14. — Id. Mon. Troch. XVIII. t. 15. 2 (Surinam, Demerara);
5. *P. viridicaudata.* — ? *Trochilus (Polytmus) pygmaeus* Tsch. (nec Spix) Consp. p. 36. 198. — Id. Faun. Per. p. 243. 1. — *Phaëthornis viridicaudata* Gould P. Z. S. 1857. p. 14. — Id. Mon. Troch. XV. t. 6 (Inneres Brasilien u. Peru);
6. *P. nigrocincta.* — *Phaëthornis nigrocincta* Lawr. Ann. Lyc. Hist. New-York 1858. p. 260. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 15. 1 (Amazonenstrom);
7. *P. obscura.* — *Phaëthornis obscura* Gould P. Z. S. 1857. p. 14. — Id. Mon. Troch. XV. t. 5 (Inneres Brasilien);
8. *P. rufiventris.* — *Brin blanc jeune âge* Vieill. Ois. dor. I. p. 39. t. 19. — *Trochilus rufigaster* (!) Id. N. D. VII. p. 357. — Id. Enc. p. 551. 11. — *Trochilus Davidianus* Less. Troch. t. 13. — Jard. Humm. B. II. p. 127. — *Phaëthornis Davidianus* Id. l. l. II. p. 151. 7.— Gray Gen. B. I. p. 108. 13.— *Phaëthornis rufigaster* Id. l. l. I. p. 108. 12. — *Trochilus pygmaeus* Cab. (nec Spix) Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 198. — *Eremita Davidianus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. — *Pygmornis Davidianus* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 9. 29 (Guiana, Cayenne).— Von *T. eremita* durch längere weissgespitzte Mittelschwanzfedern leicht unterscheidbar;
9. *P. striigularis.* — *Phaëthornis striigularis* Gould Mon. Troch. VIII. t. 15. — Scl. B. Bogot. p. 11. 67 (Neugranada);
10. *P. Adolphi* Sallé MSS. — *Phaëthornis Adolphi* „Bourc." Scl. P. Z. S. 1856. p. 287. 20. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 15. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 126. 177 (Central-America und Mexico);
11. *P. amaura* Bourc. R. & Mag. Z. 1856. p. 552. — *Phaëthornis atrimentalis* Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York 1858. p. 260. — *Phaëthornis amaura* Gould Mon. Troch. XVII. t. 15 (Neugranada);
12. *P. Longuemarei.* — *Trochilus Longuemareus* Less. Troch. p. 15. t. 2 & p. 160. t. 62. — Jard. Humm. B. II. p. 126. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 709. 199. — *Phaëthornis Longuemareus* Jard. Humm. B. II. p. 151. 7. — Gray Gen. B. I. p. 104. 11. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 10. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 14. — *Phaëthornis Longuemari* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14 (Cayenne, Guiana, Trinidad). —

t. 4. — Diezmann Colibr. p. 87. t. 4. — *Phaëthornis rufigaster* (!) Jard. Humm. B. II. p. 151. 8.— Burm. Th. Bras. II. p. 326. 4. — *Phaëthornis sp.* Gray Gen. B. III. App. p. 30a.— *Phaëthornis eremita* Gould Mon. Troch. I. t. 6.— Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 12.— *Eremita rufigaster* (!) Rchb. (nec Vieill.) Aufz. Colibr. p. 14. — *Pygmornis rufigaster* (!) Bp. (nec Vieill.) Consp. Troch. p. 3. gen. 9. 28. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

8. 3. P. griseogularis Bp.

Consp. Troch. p. 3. gen. 9. 30.— *Phaëthornis griseogularis* Gould P. Z. S. 1851. p. . . . . — Id. Mon. Troch. II. t. 14. — Scl. B. Bogot. p. 11. 68. — *Eremita griseogularis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —

Peru — ♀ — 1 St.

Gen. PHAËTHORNIS Sws. 1831. —

Phoethornis (!) Sws. 1827. *Phrethornis* (!) Boie 1831. *Phoetornis* (!) Less. 1832. *Phaethornis* (!) Jard. 1833. *Phaetornis* (!) Gray 1848. *Phaëtornis* (!) Bp. 1849. *Ptyonornis* Rchb. 1854.

9. 1. P. squalida Jard.

Humm. B. II. p. 151. 6. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 11. — Burm. Th. Bras. II. p. 325. 3. — *Trochilus squalidus* „Natt.“ Temm. Pl. col. 120. 1. — Less. Man. Orn. II. p. 74. — Id. Colibr. t. 8. — Id. Trait. p. 289. 3. — Jard. Humm. B. II. p. 125. — *Trochilus intermedius* Less. Troch. p. 65. t. 19. — Jard. Humm. B. II. p. 123. — *Trochilus leucophrys* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 18. — *Phaëthornis intermedius* Jard. Humm. B. II. p. 150. 4. — Gray Gen. B. I. p. 104. 8. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 8. — Gould Mon. Troch. VI. t. 15. — *Phaëthornis leucophrys* Gray Gen. B. I. p. 104. 4. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 179. 4.— *Phaëthornis brasiliensis* Gray (nec Lath.) Gen. B. I. p. 104. 10. — *Ptyononornis intermedia* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

10. 2. P. anthophila Gray

Gen. B. I. p. 104. 15. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 16. — Gould Mon. Troch. VII. t. 13. — Scl. B. Bogot. p.

11. 66. — *Trochilus anthophilus* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 47.—Id. R. Z. 1843. p. 71. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

11. 3. P. longirostris Nob.

Trochilus longirostris Delattre Echo du Mond. Sav. 15. Jun. 1843. no. 45. col. 1070. — *Trochilus cephalus* Bourc. & Muls. R. Z. 1848. p. 269. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Ptyonornis cephalus* Rchb. Aufz Colibr. p. 14. — *Phaëthornis cephalus* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 6. 19.— Gould Mon. Troch. XVI. t. 5. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 126. 176. —
Guatimala — ♂ — 1 St.

12. 4. P. eurynome Jard.

Humm. B. II. p. 153. 2. — Gray Gen. B. I. p. 104. 5. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 5. — Gould Mon. Troch. I. t. 5. — Burm. Th. Bras. II. p. 324. 2. — *Trochilus eurynome* Less. Troch. p. 91. t. 31. — Jard. Humm. B. II. p. 121. t. 28. — *Trochilus melanotis* „Licht." Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 17. — *Phaëthornis melanotis* Gray Gen. B. I. p. 104. 3. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 3. — *Ptyonornis eurynome* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —
Chile — ♂, ♀; Brasilien — ♀ — 3 St.

13. 5. P. malaris Gray

Gen. B. I. p. 104. 2. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 2. — *Colibri à longue queue de Cayenne* Buff. Pl. enl. 600. 3. — *Brin blanc mâle* Vieill. Ois. dor. I. p. 37. t. 17. — *Trochilus superciliosus* Id. (nec Lin.) Enc. p. 549. 5. — Less. Colibr. p. 35. t. 6. — Id. Trait. p. 288. 2. — Jard. Humm. B. II. p. 119. t. 26. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 195. — Burm. Th. Bras. II. p. 323. 1.— *Trochilus malaris* „Licht." Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 15. — *Phaëthornis superciliosus* Sws. (nec Lin.) Class. B. II. p. 330. — Jard. Humm. B. II. p. 150. 1. — Gray Gen. B. I. p. 104. 1. — Bp. Consp. I. p 67. gen. 149. 1. — Pelzeln Sitzungsber. math.-naturw. Class. Kais. Acad. Wien. 1856. p. 157. 1. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 4. —
Cayenne — 2 ♂; Bahia — ♀ — 3 St.

14. 6. P. superciliosa Nob.

Polytmus cayanensis longicaudus *) Briss. Av. III. p. 686.

*) Brisson's oben citirte Beschreibung des *Polytmus cayanensis longicaudus*, auf

13. t. 35. 5. — *Trochilus superciliosus* Lin. S. N. p. 189. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p. 302. 3. — Wied Beitr. IV. p. 116. 20. — „Licht." Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 16. — *Trochilus Pretrei* Delattre & Less. R. Z. 1839. p. 20. — *Trochilus brasiliensis* Cab. (nec Lath.) Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 196. — *Phaëthornis Pretrei* Gray Gen. B. I. p. 104. 16. t. 35. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 15. — Gould Mon. Troch. VII. t. 11. — *Trochilus affinis* Natt. in Mus. Vindob. — *Phaëthornis affinis* Pelzeln Sitzungsber. math.-naturw. Class. Kais. Acad. Wien. 1857. p. 157. 2. —
Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Gen. AMETRORNIS *) Rchb. (Mart.) 1854. —

Orthornis Bp. (Mai.) 1854.

15. 1. A. Bourcieri Rchb.

Aufz. Colibr. p. 14. — *Trochilus Bourcieri* Less. Troch. p. 62. t. 18. — Jard. Hamm. B. II. p. 124. — *Phaëthornis Bourcieri* Id. l. l. II. p. 150. 5. — Gray Gen. B. I. p. 104. 9. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 9. — Gould Mon. Troch. V. t. 15. — *Orthornis Bourcieri* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 7. 22. —
Cayenne — ♂ — 1 St.

---

welche Linné's *Trochilus superciliosus* gegründet ist, scheint bisher wenig berücksichtigt und meistens ohne nähere Prüfung mit dem *Brin blanc* Vieillot's identificirt worden zu sein. Nur Lichtenstein hat im berliner Museum den *T. superciliosus* Linné's und Latham's von dem Vieillot's und Lesson's richtig unterschieden, und ihm scheint der Prinz zu Wied gefolgt zu sein, wenn er die von ihm gesammelten, später von Delattre und Lesson als *T. Pretrei* beschriebenen Exemplare richtig als ächte *T. superciliosi* betrachtet. In der That passt Brisson's Beschreibung nur auf den nach Schomburgk auch in Guiana, also wohl ebenfalls in Cayenne vorkommenden *T. Pretrei*, da die Worte „*In universo corpore inferiore ex albo rufescit*", „*Rectrices laterales omnes similiter albo fimbriatae*" u. a. doch kaum auf eine andere Art, am allerwenigsten aber auf den vieillot'schen und lesson'schen Vogel bezogen werden können. —

*) Die zweite Art dieser Gattung ist:

2. *A. Defilippii* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. — *Trochilus Philippii* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1847. p. 623.— *Trochilus DeFilippii* Id. R. Z. 1847. p. 401.— *Phaëthornis Philippi* Gray Gen. B. I. p. 104. 18.— Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 18. — Gould Mon. Troch. X. t. 13. — *Orthornis Defilippii* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 7. 23 (Bolivien);

dagegen wird ganz entschieden mit Unrecht von Reichenbach und Bonaparte hierher gestellt *Trochilus Oseryi* Bourc. & Muls. (*Phaëthornis villosus* Lawr.) eine mit *Phaëthornis longirostris* innig verwandte, ganz typische *Phaëthornis*-Art. —

Gen. TOXOTEUCHES *) Nob. —
Guyornis (!) Bp. 1854.

16. 1. T. Guyi Nob.

Trochilus Guy Less. Troch. p. 119. t. 44 — Jard. Humm. B. II. p. 122 (juv.). — *Phaëthornis Guy* Id. l. l. II. p. 150. 3. — Gray Gen. B. I. p. 104. 6. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 6. — Gould Mon. Troch. IV. t. 9. — *Trochilus (Polytmus) apicalis* „Licht." Tsch. Consp. p. 36. 199. — Id. Faun. Per. p. 243. 2 (jun.). — *Trochilus Emiliae* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 317.— Id. R. Z. 1846. p. 316. 6 (ad.). — *Phaëthornis Emiliae* Gray Gen. B. I. p. 104. 7. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 7. — Scl. B. Bogot. p. 11. 64. — *Phaëthornis apicalis* Gray Gen. B. I. p. 104. 17. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 17. — *Phaëthornis Guyi* Scl. B. Bogot. p. 11. 65. — *Guyornis typus* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 8. 25. —

Peru — ♀ ad.; Neu-Granada — ♂ ad., ♀ jun. — 3 St.

Subfam. CAMPYLOPTERINÆ. Säbelflügler.

Gen. SPHENOPROCTUS **) Nob. —
Pampa (!) Rchb. 1854.

17. 1. S. pampa Nob.

Ornismya pampa Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 127. t. 15. — Id. R. Z. 1839. p. 18.— *Trochilus curvipennis* Licht. Preisverz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830.) no. 32. — *Campylopterus pampa* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. VI. — Jard. Humm. B. II. p. 153. 2. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 6. — Gould Mon. Troch. X. t. 11. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 127. 180. — *Polytmus*

*) Von τοξοτεύχης, mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, d. h. mit bogenförmigem Schnabel und pfeilförmigen Schwanzfedern. — Ausser der oben aufgeführten kennt man bis jetzt nur noch eine, die Gattung in Ecuador repräsentirende Art:

2. *T. Yaruqui.* — *Trochilus Yaruqui* Bourc. Compt. Rend. Nat. Acad. Sci. 1851. p. 187. — Id. R. & Mag. Z. 1851. p. 9. — Gould Mon. Troch. IV. t. 10. — *Guyornis Yaruqui* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 8. 26. —

**) Von σφήν (Keil) und πρωκτός (Steiss). —

pampa Gray Gen. B. I. p. 107. 7. — *Pampa campyloptera* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11.— Id. Troch. Enum. p. 9. t. 800. 4861-62. —

Xalapa — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. Campylopterus Sws. 1827. —

Polytmus Gray 1848 (nec Briss 1760). *Saepiopterus* & *Platystylopterus* (!) Rchb. 1854. *Platystopterus* (!) Bp. 1854.

18. 1. C. largipennis Nob.

Oiseau-mouche à larges tuyaux de Cayenne Buff. Pl. enl. 672. 2. — Vieill. Ois. dor. I. p. 51. t. 21. — *Trochilus largipennis* Bodd. Tabl. Pl. enl. 672. 2. — *Trochilus cinereus* Gm. S. N. p. 490. 41. — Lath. Ind. Orn. I. p. 308. 21. — Vieill. Enc. p. 552. 18. — *Trochilus campylopterus* Gm. S. N. p. 499. 65. — *Trochilus latipennis* Lath. Ind. Orn. I. p. 310. 33. — Vieill. Enc. p. 566. 67. — Sws. Z. Ill. III. t. 130-31. — *Colibri à ventre cendré* Vieill. Ois. dor. I. p. 18. t. 5. — *Ornismya latipennis* Less. Ois. Mouch. p. 121. t. 34. — Id. Trait. p. 286. 60. — *Campylopterus latipennis* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 709. 201. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 806. 4866. — *Polytmus largipennis* Gray Gen. B. I. p. 107. 1. —

Guiana — ♂. ♀ — 2 St.

19. 2. C. ensipennis *) Less.

Ois. Mouch. p. 124. t. 35. — Id. Trait. p. 286. 61.— Jard. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1847. p. 372. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 802. 4865 & t. 803. 4867-68. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 8. — *Trochilus ensipennis* Sws. Z. Ill. II. t. 107. — Less. Troch. p. 124. t. 46. & p. 127. t. 47. — *Trochilus latipennis* Jard. (nec Lath.) Humm. B. II. p. 146. 34. — Diezmann Colibr. p. 131. t. 34. — *Campylopterus latipennis* Jard. (nec Sws.) Humm. B. II. p. 153. 1. — *Polytmus ensipennis* Gray Gen. B. I. p. 107. 2. —

Venezuela — ♂ — 1 St.

---

*) Die brasilianische Race dieser Art soll nach Burmeister vorzüglich durch blaue Kehle und Brust abweichen und desshalb als eigene Art zu betrachten sein: *C. falcipennis* Burm. Th. Bras. II. p. 328. 1. —

20. 3. C. hemileucurus Nob.

Trochilus hemileucurus Licht. Preisverz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 33. — *Ornismya Delattrei* Less. R. Z. 1839. p. 14. — *Mellisuga Delattrei* Gray Gen. B. I. p. 113. 85. — *Campylopterus Delattrei* Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 7. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 804. 4869-70. — Gould Mon. Troch. X. t. 10. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 127. 179. —

Mexico — 2 ♂ ad.; Guatimala — ♂ jun. — 3 St.

21. 4. C. lazulus Bp.

Consp. I. p. 71. gen. 159. 4. — Gould Mon. Troch. XII. t. 9. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 2. 5. — *Trochilus lazulus* Vieill. Enc. p. 558. 36b. — Id. Gal. Ois. II. p. 296. t. 179. — *Trochilus falcatus* Sws. Z. Ill. II. t. 83. — Less. Ois. Mouch. p. 126. t. 36. — Id. Trait. p. 287. 63. — *Ornismya falcata* Id. Ois. Mouch. p. XLIV. 58. — *Campylopterus falcatus* Jard. Humm. B. II. p. 153. 3.— *Polytmus lazulus* Gray Gen. B. I. p. 107. 3. — *Saepiopterus* *) *lazulus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 801. 4863-64. —

Neu-Granada — 3 ♂ ad.; Peru — ♂ jun. — 4 St.

---

*) Wir halten die von Reichenbach vorgenommene generische Absonderung dieser Art als *Saepiopterus lazulus* ebenso wenig für gerechtfertigt, als die Aufstellung seiner Gattung *Platystylopterus* für *Campylopterus rufus* Less. (R. Z. 1839. p. 73. 13), da beide von den übrigen typischen Arten der Gattung doch wohl nur in der Färbung etwas abweichen. Dagegen wird als eigene Gattung abzusondern sein *C. hyperythrus* Cab., ein Unicum des berliner Museums, das sich, obschon in der Färbung und dem eigenthümlichem Flügelbau, noch ganz mit *C. rufus* Less. übereinstimmend, doch wesentlich durch den gerade abgeschnittenen Schwanz und vor Allem durch den auffallend kurzen und kleinen ungekrümmten Schnabel von allen übrigen Arten der Gattung *Campylopterus* hinreichend unterscheidet, als:

Loxopterus nov. gen. (von λοξός, krumm, und πτέρον, Flügel):

L. hyperythrus. — *Campylopterus hyperythrus* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 709. 202. — Gould Mon. Troch. III. t. 10. — *Platystylopterus hyperythrus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 790. 4836 - 38 (Roraima-Gebirge in Guiana).

Ausserdem hat auch Gould bereits seinen *Trochilus cyanipectus* znr Gattung erhoben, als:

Gen. *Sternoclyta* Gould 1858:

S. cyanipectus Gould Mon. Troch. XVI. t. 6. — *Trochilus cyanopectus* Id. P. Z. S. 1846. p. 88. — *Polytmus cyanopectus* Gray Gen. B. I. p. 108. 22. — *Lampornis cyanopectus* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 11. — *Saepiopterus cyanipectus* Rchb. Auf. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. — *Campylopterus cyanipectus* Bp. Consp. Troch. p. 4. gen. 14. 60 (Venezuela). —

Gen. APHANTOCHROA Gould 1853. —

22. 1. A. Cuvieri Bp.

Consp. Troch. p. 4. gen. 15. 64. — *Trochilus Cuvieri* Delattr. & Bourc. R. Z. 1846. p. 310. 11. — *Polytmus Cuvieri* Gray Gen. B. I. p. 107. 8. — *Campylopterus Cuvieri* Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 9. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 805. 4871. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 10. — *Coeligena Clemenciae fem.* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 687. 4517. —

Veragua — ♀ — 1 St.

23. 2. A. cirrochloris Gould

Mon. Troch. VI. t. 14. — *Trochilus cirrochloris* Vieill. N. D. XXIII. p. 430 — Id. Enc. p. 560. 48. — *Trochilus campylostylus* Licht. Doubl. p. 14. 115. — *Ornismya simplex* Less. Ois. Mouch. p. 119. t. 33. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 6. — Id. Trait. p. 287. 62. — *Campylopterus cirrochloris* Jard Humm. B. II. p. 154. 4. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 6. — *Polytmus cirrochloris* Gray Gen. B. I. p. 107. 4. — *Campylopterus campylostylus* Burm. Th. Bras. II. p. 329. 2. —

Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. EUPETOMENA Gould 1853. —
Prognornis Rchb. 1854.

24. 1. E. macrura Bp.

Consp. Troch. p. 8. gen. 49. 190. — *Trochilus macrourus* Gm. S. N. p. 487. 27. — Vieill. Enc. p. 566. 69. — Licht. Doubl. p. 13. 101. — Wied Beitr. IV. p. 93. 14. — *Trochilus forcipatus* Lath. Ind. Orn. I. p. 304. 9. — *Oiseau-mouche à tête bleue* Vieill. Ois. dor. I. p. 108. t. 60. — *Oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne* Id. l. l. I. p. 113. — *Ornismya hirundinacea* Less. Ois. Mouch. p. 98. t. 25. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 179. t. 39. — Id. Trait. p. 272. 2. — *Cynanthus macrourus* Jard. Humm. B. II. p. 149. 35. — *Polytmus macrourus* Gray Gen. B. I. p. 107. 9. — *Eupetomena hirundinacea* Gould Mon. Troch. VI. t. 1. — *Prognornis macroura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 806. 4873-75. — Burm. Th. Bras. II. p. 330. —

Brasilien — ♂ — 5 St.

Gen. COELIGENA *) Less 1832. —

Delattria (!) Bp. 1849. *Lamprolaima pt.* Rchb. 1854.

25. 1. C. Clemenciae Less.

Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. XVIII. — Gray List Gen. B. p. 18. — Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 3. t. 687. 4516. — *Ornismya Clemenciae* Id. Ois. Mouch. p. 216. t. 80. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 115. t. 8. — Id. Trait. p. 279. 30. — *Campylopterus Clemenciae* Jard. Humm. B. II. p. 154. 5. — *Mellisuga Clemenciae* Gray Gen. B. I. p. 112. 16. — *Delattria Clemenciae* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 155. 3. — Gould Mon. Troch. IX. t. 10. — *Lampornis Clemenciae* Bp. Consp. Troch p. 4. gen. 13. 51. — *Trochilus lucidus* Licht. in Mus. Berol. —

Mexico — 3 ♂, ♀ — 4 St.

Gen. OROTROCHILUS **) Gould 1847. —

Oreotrochilus ***) (!) Gould 1847. *Oriotrochilus* (!) Rchb. 1849.

26. 1. O. Pichinchae Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 177. 4. — Gould Mon. Troch. II. t. 4. — *Trochilus Pichincha* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 17. Jul. 1849. p. . . . — *Oreotrochi-*

---

*) Ausserdem scheint noch als hierher gehörig betrachtet werden zu müssen:

2. *C. Henrici.* — *Ornismya Henrica* (!) Less. & Delattr. R. Z. 1839. p. 17.— *Topaza Henrica* Gray Gen. B. I. p. 110. 9. — *Delattria Henrica* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 155. 1. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 14. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 29. 187. — *Lamprolaima Henrica* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Heliodoxa Henrica* Id. Troch. Enum. p. 6. t. 742. 4701 - 3 (Mexico und Guatimala). —

**) Ausser den drei oben angeführten zählt diese Gattung noch folgende drei Mitglieder:

4. *O. Adelae* Gould P. Z. S. 1847. p. 10. 4. — Gray Gen. B. I. p. 104. 4. — Gould Mon. Troch. I. t. 4. — Bp. Consp. I. p. 76. gen. 177. 5. — *Trochilus Adela* Orb. & Lafr. Syn. p. 33. 32.— Orb. Voy. p. 377. 322.— *Orthorhynchus Adela* Id. l. l. t. 61. 2 (Bolivien);

5. *O. Chimborazo* Gould P. Z. S. 1847. p. 10. 3. — Gray Gen. B. I. p. 104. 3. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 177. 3. — Gould Mon. Troch. II. t. 3. — *Trochilus Chimborazo* Bourc. R. Z. 1846. p. 305 (Chimborazo);

6. *O. melanogaster* Gould P. Z. S. 1847. p. 10. 5. — Gray Gen. B. I. p. 104. 5. — Bp. Consp. I. p. 177. 6.— Gould Mon. Troch. XVIII. t. 6 (Peru).—

***) Da *Oreotrochilus* als sechssylbiges Wort nicht anwendbar, verkürzen wir dasselbe Analogie von ὀϱοσπίζης u. a. in *Orotrochilus.* —

lus Jamesoni Jard. Contrib. Orn. 1849. p. 42. — Id. l. l. 1850. p. 27. 1. t. 43. —
Pichincha — ♂ — 1 St.

27. 2. O. Estellae Gould

P. Z. S. 1847. p. 10. 1. — Gray Gen. B. I. p. 104. 1. — Gould Mon. Troch. I. t. 2. — Bp. Consp. I. p. 76. gen. 177. 1.— *Trochilus Estella* Orb. & Lafr. Syn. p. 32. 31.— Orb. Voy. p. 376. 321. — *Trochilus Ceciliae* Less. R. Z. 1839. p. 43. 1. — *Orthorhynchus Estella* Orb. Voy. t. 61. 1. —
Bolivien — ♂, ♀ — 2 St.

28. 3. O. leucopleurus Gould

P. Z. S. 1847. p. 10. 2. — Gray Gen. B. I. p. 104. 2. — Gould Mon. Troch. I. t. 3. — Bp. Consp. I. p. 76. gen. 177. 2. — *Oreotrochilus leucopterus* (!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 15. — Id. Troch. Enum. p. 12. —
Chile — ♂ — 1 St.

Gen. Topaza *) Gray 1840. —

Trochilus Lin. 1758 (nec 1748). *Lampornis* Rchb. 1849 (nec Sws. 1827).

29. 1. T. pella Gray

List Gen. B. p. 18.—Id. Gen. B. I. p. 110. 1.—Bp. Consp. I. p. 73. gen. 163. 1.— Gould Mon. Troch. II. t. 1.—Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 797. 4853-55. — *Trochilus pella* Lin. S. N. p. 189. 2. — Lath. Ind. Orn. I. p. 302. 2. — Vieill. Enc. p. 554. 25. — Less. Colibr. p. 21. t. 2-5 (♂ ad., var., ♂ jun. & ♀). — Id. Trait. p. 288. 1. t. 78. 1. — Jard. Humm. B. II. p. 115. t. 24 & p. 118. t. 25 (♂ ad. & var.). — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 191. — Burm. Th. Bras. II. p. 327. Anm. — ? *Trochilus paradiseus* Lin. S. N. p. 189. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 301. 1. — Vieill. Enc. p. 556. 32. — *Colibri topaze* Buff. Pl. enl. 599. 1. — Vieill. Ois. dor. I. p. 15. t. 2 & p. 16. t. 3 (♂ & ♀). — *Lampornis pella* Jard. Humm. B. II. p. 155. 6 —
Guiana — 3 ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ — 6 St.

---

*) Nur noch eine Art dieser prachtvollen Gattung kennt man bis jetzt:
2. *T. pyra* Gray Gen. B. I. p. 110. 3. — Bp. Consp. I. p. 72. gen. 163. 2. — Gould Mon. Troch. II. t. 2 — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 797. 4856-57. — *Trochilus (Topaza) pyra* Gould P. Z. S. 1846. p. 85 (Rio Negro). —

Gen. EULAMPIS Boie 1831. —

Culampis (!) Less. 1832.

30. 1. E. jugularis „Strickl."

Gray List Gen. B. p. 17. — Bp. Consp. I. p. 72. gen. 161. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 796. 4851-52. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 5. — *Trochilus jugularis* Lin. S. N. p. 190. 7. — Lath. Ind. Orn. I. p. 305. 12. — *Colibri violet de Cayenne* Buff. Pl. enl. 600. 2. — Vieill. Ois. dor. I. p. 126. — *Trockilus auratus* Gm. S. N. p. 487. 29. — Less. Colibr. p. 46. t. 10. — Id. Trait. p. 289. 5. — *Trochilus violaceus* Gm. S. N. p. 488. 41. — Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 17. — Vieill. Enc. p. 552. 14. — *Trochilus venustissimus* Gm. S. N. p. 490. 37. — *Trochilus cyanomelas* Id. l. l. p. 498. 62. — *Certhia prasinoptera* Sparm. Mus. Carls. t. 81. — Lath. Ind. Orn. I. p. 300. 71. — *Trochilus granatinus* Id. l. l. I. p. 305. 11. — *Trochilus cyaneus* Id. l. l. I. p. 309. 25. — *Trochilus Bancrofti* Id. l. l. I. p. 317. 53. — *Grénat* Vieill. Ois. dor. I. p. 17. t. 4. — *Noir bleu* Id. l. l. I. p. 116. — *Colibri bleu* Id. l. l. I. p. 125. — *Colibri à gorge grénat* Id. l. l. I. p. 126. — *Colibri à gorge carmin* Id. ibid. — *Souimanga prasinoptère* Id. l. l. II. p. 65. — *Trochilus auritus* Id. Enc. p. 555. 29. — *Cynanthus jugularis* Jard. Humm. B. II. p. 145. 14. — *Polytmus jugularis* Gray Gen. B. I. p. 108. 19. — *Topaza violacea* Id. l. l. I. p. 110. 2. —

Martinique — ♂ — 1 St.

Subfam. LAMPORNITHINÆ. Nymphen.

Gen. LAMPORNIS Sws. 1827. —

Anthracothorax Boie 1831. *Sericotes* (!), *Floresia* (!) & *Hypophania* Rchb. 1854. *Sericotis* (!) Bp. 1854.

31. 1. L. holosericea *) Jard.

Humm. B. II. p. 155. 5. — *Trochilus holosericeus* Lin. S.

*) Sehr nahe verwandt mit dieser Art ist:

L. chlorolaema. — *Eulampis nov. sp.* „Gould" Bp. Consp. I. p. 72. gen.

N. p. 191. 11. — Lath. Ind. Orn. I. p. 305. 14. — Vieill. Enc. p. 551. 12. — Less. Colibr. p. 76. t. 20. — Id. Trait. p. 290. 10. — Jard. Humm. B. II. p. 103. — *Vert et noir* Vieill. Ois. dor. I. p. 19. t. 6.— *Colibri à ventre noir* Id. l. l. I. p. 119. t. 65.— *Trochilus atrigaster* (!) Shaw. — Vieill. N. D. VII. p. 356. — Id. Enc. p. 550. 8. — *Polytmus holosericeus* Gray Gen. B. I. p. 108. 12. — *Sericotes holosericeus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothorax holosericeus* Id. Troch. Enum. p. 9. t. 794. 4847. — *Eulampis holosericea* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 161. 2. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 6. —

Portorico — ♂, ♀ — 2 St.

32. 2. L. veraguensis „Gould“

Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 13. 47. — Gould Mon. Troch. XV. t. 9. — *Sericotes veraguensis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. – *Anthracothorax veraguensis* Id. Troch. Enum. p. 9. t. 794. 4848. —

Veragua — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

33. 3. L. graminea Jard.

Humm. B. II. p. 154. 2. — Gould Mon. Troch. XV. t. 7.— *Colibri à cravate verte* Buff. Pl. enl. 621. 1. — Vieill. Ois. dor. I. p. 25. t. 10. — *Colibri à gorge verte de Cayenne* Buff. Pl. enl. 671. 1. — *Trochilus gramineus* Gm. S. N. p. 488. 30. — Vieill. Ois. Amér. sept. II. p. 73. — Less. Colibr. p. 52. t. 12 & p. 56. t. 12b. — Id. Trait. p. 290. 9. — Jard. Humm. B. I. p. 149. t. 32 & p. 150. t. 33. — Diezmann Colibr. p. 148. t. 32 & p. 150. t. 33. — *Trochilus maculatus* Gm. S. N. p. 488. 32. — Vieill. Enc. p. 563. 59 (juv.). — *Trochilus gularis* Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 16.—Vieill. Enc. p. 553.— *Trochilus pectoralis* Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 18.— Vieill. Enc. p. 551. 13.— Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 183. — *Hausse-col vert* Vieill. Ois. dor. I. p. 23. t. 9.— ?*Plastron violet* Id. l. l. I. p. 124. t. 70.— *Picaflor pintado* Azar. Apunt. no. 298 (juv.). — *Trochilus marmoratus* Vieill. Enc. p. 567. 70 (juv.). — *Polytmus dominicus* (!) Gray (nec Lin.) Gen. B. I. p. 108. 11.— *Lampornis dominicus* (!) Bp. (nec Lin.) Consp. I. p. 71. gen.

---

161. 3. — *Eulampis chlorolaema* „Gould MSS. 1851.“ Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 12. 14. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 7. — Newton Ibis 1859. p. 138. 3. — *Sericotes chlorolaemus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothorax chlorolaemus* Id. Troch. Enum. p. 9 (Insel Nevis, St. Croix, St. Thomas, St. John's etc.); von derselben hauptsächlich durch geringere Grösse, hellere, glänzendere Färbung der Kehle und die Erweiterung des blauen Brustfleckes in ein Brustband unterscheidbar. —

160. 2. — *Hypophania dominica* (!) Rchb. (nec Lin.) Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothorax dominicus* (!) Id. Troch. Enum. p. 9. t. 793. 4845-46. —
Guiana — 4 ♂ ad., ♂ jun. — 5 St.

34. 4. L. mango Sws.

Z. Ill. III. t. 358. — Jard. Humm. B. II. p. 154. 1. — Sws. Class. B. II. p. 330. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 160. 1. — Gould Mon. Troch. XII. t. 12. — Burm. Th. Bras. II. p. 331. — *Trochilus mango* Lin. S. N. p. 191. 10. — Lath. Ind. Orn. I. p. 307. 20. — Vieill. Enc. p. 557. 36. — Wied Beitr. IV. p. 47. 1. — Less. Colibr. p. 58. t. 13-14. — Jard. Humm. B. II. p. 100. t. 20. — Sws. B. Braz. t. 27-28. — Aud. B. N.-Amer. t. 574. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 170. 251. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 182. — *Colibri à queue violette* Buff. Pl. enl. 671. 2. — Vieill. Ois. dor. I. p. 27. t. 11. — *Colibri du Méxique* Buff. Pl. enl. 680. 3. — *Colibri de la Jamaïque* Id. l. l. 680. 3. — *Trochilus violicauda* Bodd. Tabl. Pl. enl. 671. 2. — *Trochilus punctulatus* Gm. S. N. p. 488. 33. — Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 15. — Vieill. Enc. p. 552. 15 (juv.). — *Trochilus albus* Gm. S. N. p. 488. 34. — *Trochilus nitidus* Lath. Ind. Orn. I. p. 305. 13. — *Plastron noir* Vieill. Ois. dor. I. p. 20. t. 7 (ad.). — *Colibri à ventre piqueté* Id. l. l. I. p. 21. t. 8 (juv.). — *Picaflor faxa negra a lo largo* Azar. Apunt. no. 295 (juv.). — *Picaflor turqui debaxo* Id. l. l. no. 296 (ad.) — *Trochilus fasciatus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 303. — *Trochilus nigricollis* Vieill. N. D. VII. p. 349. — Id. Enc. p. 553. 20. — *Trochilus quadricolor* Id. N. D. VII. p. 353. — Id. Enc. p. 555. 28. — *Trochilus atricapillus* Id. N. D. VII. p. 354. — Id. Enc. p. 553. 22. — *Trochilus punctatus* Id. l. l. p. 550. 9 (juv.). — *Trochilus lazulus* Less. (nec Vieill.) Trait. p. 290. 7. — *Polytmus mango* Gray Gen. B. I. p. 107. 10. — *Anthracothorax mango* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 791. 4839-41. —
Brasilien — 4 ♂ ad., 2 ♂ juv., 2 ♀ — 8 St.

35. 5. L. porphyrura Bp.

Consp. Troch. I. p. 3. gen. 13. 46. — Gould Mon. Troch. XV. t. 8. — *Trochilus porphyrurus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 396. — Id. Nat. Misc. t. 333. — *Trochilus Floresi* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. ... — Id. R. Z. 1846. p. 316. 16. — *Polytmus porphyrurus* Gray Gen. B. I. p. 108. 20. — *Lampornis mango* Gosse (nec Sws.) B. Jamaic. p. 88. — Id. Ill. B. Jamaic. t. 18. — *Lampornis Floresi*

Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 7. — *Floresia porphyrura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothorax porphyrurus* Id. Troch. Enum. p. 8. t. 795. 4849-50. — *Trochilus bromicolor* „Less." in Mus. Berol. —
Jamaica — ♂ — 1 St.

Gen. CHALYBURA Rchb. (Mart.) 1854. —

Cyanochloris Rchb. (Mart.) 1854. *Hypuroptila* Gould (Mai.) 1854.

36. 1. C. Buffoni Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Buffonii* Less. Troch. p. 31. t. 5. — Jard. Humm. B. II. p. 98. t. 19. — *Lampornis Buffoni* Id. l. l. II. p. 156. 10. — Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 9. — *Polytmus Buffoni* Gray Gen. B. I. p. 108. 17. — *Hypuroptila Buffoni* Gould Mon. Troch. VII. t. 14. — Scl. B. Bogot. p. 11. 69. — *Agyrtria Buffoni* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 766. 4773-74. —
Caracas — 2 ♂; Veragua — 2 ♂, ♀ — 5 St.

37. 2. C. caeruleiventris Nob.

Trochilus (Glaucis) caeruleogaster (!) Gould P. Z. S. 1847. p. 96. — *Polytmus caeruleogaster* (!) Gray Gen. B. I. p. 108. 18. — *Lampornis caeruleigaster* (!) Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 10. — *Hypuroptila caeruleigaster* (!) Gould Mon. Troch. VII. t. 15. — Scl. B. Bogot. p. 11. 70. — *Cyanochloris caeruleiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Agyrtria caeruleiventris* Id. Troch. Enum. p. 7. t. 767. 4775-76. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. EUGENES Gould 1856. —

38. 1. E. fulgens Gould

Mon. Troch. XII. t. 7. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 128. 185. — *Trochilus fulgens* Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 92. — *Ornismya Rivolii* Less. Ois. Mouch. p. 48. t. 4. — *Trochilus Rivolii* Jard. Humm. B. II. p. 96. t. 18. — Id. l. l. II. p. 136. 5. — *Mellisuga fulgens* Gray Gen. B. I. p. 112. 2. — *Delattria fulgens* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 155. 4. — *Coeligena fulgens* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. —

Id. Troch. Enum. p. 3. t. 686. 4513-14. — *Trochilus melanogaster* Licht. in Mus. Berol. —
Mexico — 3 ♂ ad., ♂ jun. — 4 St.

Gen. CHRYSOLAMPIS Boie 1831. —

39. 1. C. moschita Gray

List Gen. B. p. 19. — Bp. Consp. I. p. 82. gen. 194. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 332. — Gould Mon. Troch. XII. t. 5. — *Trochilus moschitus* Lin. S. N. p. 192. 14. — Lath. Ind. Orn. I. p. 316. 49. — Vieill. Enc. p. 570. 79. — Wied Beitr. IV. p. 56. 3. — Jard. Humm. B. I. p. 103. t. 11 & II. p. 139. 16. — Diezmann Colibr. p. 108. t. 11. — Sws. B. Braz. t. 30. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 180. — *Trochilus pegasus* Lin. S. N. p. 192. 16. — Lath. Ind. Orn. I. p. 315. 46 (♀). — *Trochilus elatus* Lin. S. N. p. 192. 19. — Lath. Ind. Orn. I. p. 316. 50. — *Oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil* Buff. Pl. enl. 227. 2 & 640. 1. — *Trochilus carbunculus* Gm. S. N. p. 498. 61. — Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 54. — *Trochilus guianensis* Gm. S. N. p. 498. 63. — Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 52. — Vieill. Enc. p. 572. 86. — *Rubis-topaze* Id. Ois. dor. I. p. 62. t. 29, p. 64. t. 30, p. 103. t. 55 & p. 104. 56. — *Oiseau-mouche à gosier doré* Id. l. l. I. p. 89. t. 46. — *Escarboucle* Id. l. l. I. p. 102 t. 54. — *Oiseau-mouche de la Guiane* Id. l. l. I. p. 116. — ? *Trochilus hypophaeus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 333 (juv.). — *Ornismya moschita* Less. Ois. Mouch. p. 166. t. 52-54. — Id. Trait. p. 280. 34. — *Mellisuga moschita* Steph. Gen. Z. XIV. p. 253. — Gray Gen. B. I. p. 113. 96. — *Chrysolampis mosquitus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 723. 4646-49. —
Guiana — 4 ♂ ad., 3 ♂ jun., ♂ juv., 3 ♀ — 11 St.

40. 2. C. Reichenbachi *) Nob.

Chrysolampis carbunculus Rchb. (nec Gm.) Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 723. 4650. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

---

*) Mit Recht scheint Reichenbach die columbianische Race von der Guiana's und Brasilien's getrennt zu haben, denn mehrere uns vorliegende Exemplare aus Neu-Granada sind nicht nur etwas kleiner und bedeutend kleinschnäbliger, sondern auch viel dunkler und glänzender gefärbt, als ihre östlichen Repräsentanten. Eine Vergleichung der Maassen wird diesen Unterschied am besten veranschau-

Gen. HELIODOXA Gould 1849. —

Leadbeatera (!) Bp. 1849.

41. 1. **H. sagitta** Nob.

? Leadbeatera sp. Bp. Consp. I. p. 70. gen. 156. 3. — *Leadbeatera sagitta* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena sagitta* Id. l. l. p. 23. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 689. 4525 & t. 690. 4527-28. —

Nord-Peru — ♂ juv. — 1 St.

42. 2. **H. Leadbeateri** Scl.

B. Bogot. Add. II. p. 2. 10. — *Trochilus Leadbeateri* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 43. t. 5. — Id. R. Z. 1843. p. 102. — *Hylocharis Leadbeateri* Gray Gen. B. I. p. 112. 3. — *Leadbeatera grata* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 156. 2. — *Leadbeatera Otero* Rchb. (nec Tsch.*) Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena otero* Id. Troch. Enum. p. 3. t. 789. 4523-24. —

Neu-Granada — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. THALURANIA Gould 1847. —

Mellisuga Boie 1831 (nec Briss. 1760). *Thaluronia* (!) Gray

---

lichen. Exemplare aus Guiana und Cayenne messen: G. L. 3" 8‴, Fl. 2" 3‴, Schwz. 1" 5‴, Schnabelf. 5 3/4‴, während bei bogotensischen die G. L. nur 3" 3‴, Fl. 2", Schwz. 1" 2 1/2‴, Schnabelf. 4 1/4‴ beträgt. —

*) Die Vergleichung columbianischer Exemplare mit dem leider etwas defecten peruanischen Original-Exemplare Tschudi's im berliner Museum hat uns von der Selbstständigkeit beider Arten hinlänglich überzeugt. Zwar lassen sich in der Färbung nur geringe Abweichungen wahrnehmen, aber die weit bedeutendere Grösse und vor Allem der verhältnissmässig enorme Schnabel des Peruaners scheinen uns zur Wahrung seiner Artrechte hinzureichen. Wir begnügen uns desshalb hier damit, die Maassen beider Arten zusammen zu stellen:

H. Otero: G. L. 5" 3‴, Fl. 2" 10‴, Schwz. 2" 3‴, Schnabelf. 11‴;
H. Leadbeateri: G. L. 4" 9‴, Fl. 2" 7‴, Schwz. 2", Schnabelf. 8‴.

Es würden somit zu *Heliodoxa* noch zu rechnen sein:

3. *H. Otero.* — *Trochilus (Lampornis) Otero* Tsch. Consp. p. 38. 212. — Id. Faun. Per. p. 249. 15. t. 23. 2. — *Leadbeatera Otero* Bp. Consp. Troch. p. 4. gen. 19. 77 (Peru);
4. *H. jacula* Gould P. Z. S. 1849. p. 96. — Id. Mon. Troch. XVI. t. 2. — Scl. B. Bogot. p. 11. 73. — *Leadbeatera jacula* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 156. 1. — *Coeligena jacula* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 688. 4522 (Neu-Granada);
5. *H. Jamesoni.* — *Trochilus Jamersoni* Bourc. R. & Mag. Z. 1851. p. 97. — *Leadbeatera Jamersoni* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena Jamersoni* Id. Troch. Enum. p. 4 (Ecuador). —

1849. *Glaucopis* Burm. 1856 (nec Hübn. 1816). *Thalucania* (!) Bourc. 1856. *Tholucania* (!!) Hartl. 1857.

43. 1. T. glaucopis Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 178. 5. — Gould P. Z. S. 1852. p. 9. — Id. Mon. Troch. XI. t. 14. — *Trochilus glaucopis* Gm. S. N. p. 497. 56. — Vieill. Enc p. 557. 37. — Wied Beitr. IV. p. 85. 12. — Jard. Humm. B. II. p. 86. — *Trochilus frontalis* Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 60. — *Oiseau-mouche à queue fourchue du Brésil* Vieill. Ois. dor. I. p. 116.— *Ornismya glaucopis* Less. Ois. Mouch. p. 175. t. 58-59.—Id. Trait. p. 273. 6. — *Cynanthus glaucopis* Jard. Humm. B. II. p. 147. 24. — *Polytmus glaucopis* Gray Gen. B. I. p. 108. 58.— *Coeligena glaucopis* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 685. 4509-10.— *Glaucopis frontalis* Burm. Th. Bras. II. p. 333. 1.—
Brasilien — 5 ♂, 4 ♀ — 9 St.

44. 2. T. Fanny Bp.

Consp. Troch. p. 8. gen. 48. 178. — *Trochilus Fannyi* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 310.— *Hylocharis Fannyi* Gray Gen. B. I. p. 114. 20. — *Trochilus verticeps* Gould Contrib. Orn. 1851. p. 79. t. 71. — *Thalurania verticeps* Id. P. Z. S. 1852. p. 9. — Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 48. 185. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 11.— *Thalurania Lydia* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Riccordia verticeps* Id. l. l. p. 7. — *Coeligena Fanny* Id. Troch. Enum. p. 3. t. 683. 4502-3.— *Chlorestes verticeps* Id. l. l. p. 4. t. 705. 4590.—
Peru — ♂ — 1 St.

45. 3. T. eryphile Bp.

Consp. I. p. 77. gen. 178. 7. — Gould P. Z. S. 1852. p. 9. — Id. Mon. Troch. XVI. t. 10. — *Ornismya eryphile* Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 148. t. 25. — *Ornismya meriphile* (!) Less. err. — *Polytmus eriphile* Gray Gen. B. I. p. 108. 64. — *Coeligena eryphile* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 682. 4507-8. — *Glaucopis eriphile* Burm. Th. Bras. II. p. 334. 2. — *Trochilus excisus* Licht. in Mus. Berol. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

46. 4. T. nigrofasciata Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 178. 2. — Gould P. Z. S. 1852. p. 8. — *Trochilus nigrofasciatus* Id. l. l. 1846. p. 98. 12. — *Polytmus nigrofasciatus* Gray Gen. B. I. p. 108. 62. — *Coeligena nigrofasciata* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 684. 4506. —
Rio-Negro — ♂ — 1 St.

47. 5. T. furcata Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 178. 1. — Gould P. Z. S. 1852. p. 8. — Id. Mon. Troch. XVI. t. 7. — *Oiseau-mouche à queue fourchue* Buff. Pl. enl. 599. 2. — *Trochilus furcatus* Gm. S. N. p. 486. 26. — Lath. Ind. Orn. I. p. 304. 8. — Vieill. Enc. p. 572. 87. — Jard. Humm. B. I. p. 125. t. 23. — Diezmann Colibr. p. 130. t. 23. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 194. — *Oiseau-mouche violet* Vieill. Ois. dor. I. p. 71. t. 34. — *Ornismya furcata* Less. Ois. Mouch. p. 82. t. 18. — Id. Trait. p. 273. 4. — *Cynanthus furcatus* Jard. Humm. B. II. p. 148. 25. — *Polytmus furcatus* Gray Gen. B. I. p. 108. 61. — *Thalurania Gyrinno* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena Gyrinno* Id. Troch. Enum. p. 3. t. 682. 4500-1. —
Minor, cauda modica. — Long. tot. 3″ 10‴, al. 1″ 10‴, caud. 1″ 4‴. —
Guiana — 2 ♂, ♀ — 3 St.

48. 6. T. forficata Nob.

Thalurania furcata Rchb. (nec Gm.) Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena furcata* Id. (nec Gm.) Troch. Enum. p. 3. t. 682. 4498-99. — *Trochilus furcatus* Burm. (nec Gm.) Th. Bras. II. p. 335. Anm. 3. — *Thalurania furcatoides* (!) Gould Mon. Troch. XVI. in text. ad tab. 7. —
Maior, cauda multo longiore. — Long. tot. 4″ 3‴, al. 2″, caud. 1″ 9‴. —
Para — ♂ — 1 St.

49. 7. T. columbica Rchb.

Aufz. Colibr. p. 7. — Scl. B. Bogot. p. 13. 102. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 8. — *Ornismya columbica* Bourc. & Muls. R. Z. 1843. p. 2. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. . . . t. 6. — *Polytmus columbicus* Gray Gen. B. I. p. 108. 60. — *Thalurania columbiana* Gould P. Z. S. 1852. p. 8. — *Coeligena columbica* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 685. 4511-12. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

50. 8. T. Wagleri Bp.

Consp. I. p. 77. gen. 178. 6. — Gould P. Z. S. 1852. p. 9. — Id. Mon. Troch. XIII. t. 15. — *Sapphir émeraude s. Trochilus bicolor* Vieill. (nec Gm.) Ois. dor. I. p. 75. t. 36. — Id. Enc. p. 571. 81. — *Ornismya Wagleri* Less. Ois. Mouch. p. 203. t. 73. — Id. Trait. p. 274. 12. — *Trochilus Wagleri* Jard. Humm. B. II. p. 93. t. 16. — Burm.

Th. Bras. II. p. 335. Anm. 4. — *Cynanthus Wagleri* Jard. Humm. B. II. p. 147. 21. — *Hylocharis Wagleri* Gray Gen. B. I. p. 114. 14.— *Coeligena Wagleri* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 702. 4576-77. —

Para — ♂ — 1 St.

Gen. SPORADICUS *) Bp. 1854. —

Riccordia (!) Rchb. 1854. *Sporadinus* (!) Bp. 1854.

51. 1. **S. elegans Bp.**

Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 221. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 14. — *Hausse-col à queue fourchue s. Trochilus elegans* Vieill. Ois. dor. I. p. 32. t. 14. — Id. N. D. VII. p. 351. — Id. Enc. p. 556. 31. — *Ornismya Swainsoni* Less. Ois. Mouch. p. 197. t. 70. — Id. Trait. 275. 13. — *Trochilus Swainsoni* Jard. Humm. B. II. p. 88. — *Cynanthus Swainsoni* Id. l. l. II. p. 132. — *Hylocharis elegans* Gray Gen. B. I. p. 114. 18. — *Lampornis elegans* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 4. — *Riccordia elegans* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes elegans* Id. Troch. Enum. p. 4. t. 704. 4587. —

Haiti — ♂ jun. — 1 St.

Gen. PETASOPHORA Gray 1840. —

Colibri (!) Spix 1824. *Coeligena* & *Lophornis* Tsch. 1844 (nec Less. 1832). *Praxilla* Rchb. 1854. *Anaïs* Bp. 1854. *Colibris* (!) Scl. 1856.

52. 1. **P. serrirostris Gray**

List Gen. B. p. 17. — Gould P. Z. S. 1847. p. 8. 1. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 152. 1. — Gould Mon. Troch. V. t. 6. — *Trochilus serrirostris* Vieill. N. D. VII. p. 359. — Id. Enc. p. 561. 52. — *Trochilus petasophorus* Wied Reis.

---

*) Auf Cuba vertritt diese Art:

2. *S. Ricordi* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 220. — *Trochilus Ricordii* Gerv. Mag. Z. 1835. Ois. t. 41-42. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 189. 2. — *Orthorhynchus Ricordi* Orb. Voy. Cub. t. 21. 2. — *Hylocharis Ricordi* Gray Gen. B. I. p. 114. 23. — *Riccordia Ramondi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes Ramondi* Id. Troch. Enum. p. 4. t. 704. 4584-86. — *Chlorestes Ricordii* Cab. Journ. Orn. 1856. p. 99. 118. —

Bras. II. p. 191. — Id. Beitr. IV. p. 76. 10. — Temm. Pl. col. 203. 3. — Jard. Humm. B. I. p. 120. t. 13 & II. p. 81. t. 15 (♂ & ♀). — Id. I. I. II. p. 137. 9. — Diezmann Colibr. p. 113. t. 13 (♂). — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 193. — *Colibri crispus* Spix Av. Bras. I. p. 80. 1. t. 81. 1. — *Ornismya petasophora* Less. Man. Orn. II. p. 78. — Id. Ois. Mouch. p. 37. t. 1 (♂). — Id. Trait. p. 284. 54. — Id. Troch. t. 59 (♀). — *Grypus Vieillotii* Steph. Gen. Z. XIV. p. 256. — *Trochilus (Lophornis) petasophorus* Tsch. Consp. p. 37. 205. — Id. Faun. Per. p. 246. 8. — ?*Petasophora sp.* Gould P. Z. S. 1847. p. 9. Anm. — *Polytmus serrirostris* Gray Gen. B. I. p. 108. 24. — ?*Petasophora Gouldi* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 152. 2. — *Trochilus chalcotis* Licht. in Mus. Berol. — *Petasophora chalcotis & serrirostris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — Id. Troch. Enum. p. 11. — *Petasophora crispa* Burm. Th. Bras. II. p. 335. — *Trochilus janthinotus* Natt. in Mus. Vindob. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

53. 2. P. iolata Gould

P. Z. S. 1847. p. 9. 5. — Id. Mon. Troch. V. t. 3. — ?*Trochilus (Coeligena) Anais* Tsch. (nec Less.) Consp. p. 36. 201. — Id. Faun. Per. p. 244. 4. — *Polytmus iolatus* Gray Gen. B. I. p. 108. 28. — *Colibri iolatus* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 4. — *Praxilla iolata* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — *Petasophora rhodotis* „Gould" Saucerotte in Mus. Heinean. —

Bolivien — ♂ — 5 St.

54. 3. P. anais Gould

P. Z. S. 1847. p. 8. 4. — Id. Mon. Troch. V. t. 2. — *Rhamphodon anais* Less. Troch. p. 146. t. 55. — *Trochilus thalassinus pt.* Jard. (nec Sws.) Humm. B. II. p. 47. — *Trochilus anais* Id. I. I. II. t. 1 (nec t. 2). — *Polytmus anais* Gray Gen. B. I. p. 108. 27. — *Colibri anais* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 3. — Scl. B. Bogot. p. 11. 71. — *Praxilla anais* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

55. 4. P. cyanotis Gould

P. Z. S. 1847. p. 8. 2. — Id. Mon. Troch. V. t. 4. — *Ornismya anais fem.* Less. Troch. 151. t. 57 (nec t. 55). — *Trochilus cyanotus* (!) Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 41. — Id. R. Z. 1843. p. 101. — *Polytmus cyanotus* Gray Gen. B. I. p. 108. 25. — *Colibri cyanotis* Bp.

Consp. I. p. 69. gen. 153. 1. — Scl. B. Bogot. p. 11. 72.— *Praxilla cyanotis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. —
Peru — ♂ — 2 St.

56. 5. P. thalassina Gould

P. Z. S. 1847. p. 8. 3. — Id. Mon. Troch. V. t. 5. — Scl. P. Z. S. 8. Jun. 1858. B. fr. Oaxac. rec. by Sallé p. 5. 9. — Id Ibis 1859. p. 127. 132. — *Trochilus thalassinus* Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 93. — Jard. Humm. B. II. p. 47 *(pt.)*. — *Ornismya anais* Less. Troch. p. 154 (nec p. 146). — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 3. — *Rhamphodon anais* Id. Troch. p. 148. t. 56 (nec p. 146. t. 55). — *Trochilus anais* Jard. Humm. B. II. t. 2 (nec t. 1). — *Cynanthus thalassinus* Id. l. l. II. p. 148. 30. — *Polytmus thalassinus* Gray Gen. B. I. p. 108. 26. — *Colibri thalassinus* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 2.— *Colibris thalassina* Scl. P. Z. S. 1856. p. 287. 24. —
Veragua — ♂ — 1 St.

Gen. TELESILLA Rchb. 1854. —

Telesiella (!) Rchb. 1854. *Delphinella* (!) Bp. 1854.

57. 1. T. Delphinae Rchb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornismya Delphinae* Less. R. Z. 1839. p. 44. 2. — Id. Echo Mond. Sav. 1843. p. 31. — Id. Ill. Zool. II. t. 64. — *Petasophora Delphinae* Gould P. Z. S. 1847. p. 8. — Id. Mon. Troch. V. t. 8. — *Polytmus Delphinae* Gray Gen. B. I. p. 108. 30.— *Colibri Delphinae* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 6. — Scl. B. Bogot. p. 11. 73. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Subfam. HELIOTHRICHINÆ. Feeen.

Gen. SCHISTES *) Gould 1853. —

58. 1. S. Geoffroyi Gould

Mon. Troch. VI. t. 12. — Scl. B. Bogot. p. 11. 74. — *Tro-*

*) Als zweite Art gehört hierher:
S. albogularis Gould Contr. Orn. 1851. p. 140. — Id. Mon. Troch. VI. t. 13 (Ecuador). —

chilus Geoffroyi Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 37. t. 3. — Iid. R. Z. 1843. p. 101. — *Petasophora Geoffroyi* Gould P. Z. S. 1847. p. 9. 8. — *Polytmus Geoffroyi* Gray Gen. B. I. p. 108. 31. — *Colibri Geoffroyi* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 7. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. HELIOTHRIX *) Boie 1831. —

Heliothryx (!) Boie 1831. *Heliothrys* (!) Gray 1840.

59. 1. H. aurita Gray

List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 115. 1. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 154. 1. — Gould Mon. Troch. VI. t. 6. — Burm. Th. Burm. II. p. 336. — *Trochilus auritus* Gm. S. N. p. 493. 47. — Lath. Ind. Orn. I. p. 311 36. — Vieill. Enc. p. 567. 72.— Licht. Doubl. p. 13. 107.— Wied Beitr. IV. p. 104. 17. — Jard. Humm. B. II. p. 137. 8. — Sws. B. Braz. t. 29. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 188. — *Oiseau-mouche à oreilles* Vieill. Ois. dor. I. p. 57. t. 25 & p. 59. t. 26 (♂ & ♀). — *Picaflor sienas blancas* Azar. Apunt. no. 289. — *Trochilus leucocrotaphus* Vieill. N. D. VII. p. 374. — Id. Enc. p. 571. 83. — *Ornismya aurita* Less. Ois. Mouch. p. 63. t. 10-11 (♂ & ♀). — Id. Trait. p. 275. 16 (♂). — *Ornismya nigrotis* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. 20. 48 (♀). — Id. Trait. p. 276. 17. — *Heliothrix nigrotis* Gray Gen. B. I. p. 115. 2. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 154. 2. —
Guiana — ♂ — 2 St.

60. 2. H. auriculata Gray

Gen. B. I. p. 115. 3. — Gould Mon. Troch. VI. t. 7. — *Trochilus auriculatus* „Licht." Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 5. 38. t. 2. 1-2. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p.

---

*) Hierher gehören noch:

3. *H. Barroti* Gray Gen. B. I. p. 115. 4. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 154. 4. — Gould Mon. Troch. VI. t. 8. — *Trochilus Barroti* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 43. t. 4. — Id. R. Z. 1843. p. 72 (Columbien, Ecuador, Veragua);
4. *H. phdenolaema* Gould P. Z. S. 1855. p. 87. — Id. Mon. Troch. XVII. t. 8. — *Heliothrix phaenoleuca* (!) Hartl. Wiegm. Arch. XXII. 2. p. 23 (Rio-Negro);
5. *H. purpureiceps* Gould P. Z. S. 1855. p. 87. — Id. Mon. Troch. XVII. t. 9 (Popayan und Quito). —

707. 188. — *Ornismya Pouchettii* Less. R. Z. 1840. p. 72. 4.— *Heliothrix Poucheti* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 144. 2.— *Heliothrix aurita jun.* Burm. Th. Bras. II. p. 336. —
Brasilien — ♂ — 2 St.

Subfam. FLORISUGINÆ. Blüthensauger.

Gen. FLORISUGA Bp. 1849 —

Orthorhynchus Ill. 1811 (nec Cuv. 1799-1800). *Lampornis* Less. 1829 (nec Sws. 1827).

61. 1. F. mellivora Bp.

Consp. I. p. 73. gen. 168. 1. — Gould Mon. Troch. II. t. 10. — Scl. Ibis 1859. p. 128. 184. — *Trochilus mellivorus* Lin. S. N. p. 193. 20. — Lath. Ind. Orn. I. p. 310. 34. — Vieill. Enc. p. 562. 54. — Jard. Humm. B. I. p. 139. t. 30. — Diezmann Colibr. p. 144. t. 30. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 181. — Burm. Th. Bras. II. p. 339. Anm. — *Oiseau - mouche tacheté de Cayenne* Buff. Pl. enl. 276. 2 (juv.). — *Jacobine* Id. l. l. 640. 2. — *Trochilus fimbriatus* Gm. S. N. p. 493. 45. — Lath. Ind. Orn. I. p. 312. 39. — *Oiseau-mouche à gorge tachetée* Vieill. Ois. dor. I. p. 53. t. 22 (jun.). — *Oiseau-mouche à collier dit la Jacobine* Id. l. l. I. p. 55. t. 23 (ad.). — *Jacobine variée s. Trochilus mellivorus varius* Id. l. l. I. p. 56. t. 24 (juv.). — *Ornismya mellivora* Less. Ois. Mouch. p. 90. t. 21-22. — Id. Trait. p. 277. 24. — *Mellisuga surinamensis* Steph. Gen. Z. XIV. p. 243. — *Lampornis mellivora* Jard. Humm. B. II. p. 155. 7. — *Topaza mellivora* Gray Gen. B. I. p. 110. 6. — *Topaza fimbriata* Id. l. l. I. p. 110. 7. —
Guiana *) — ♂ adult., 2 ♂ adolesc., ♂ juv. — 4 St.

62. 2. F. fusca Rchb.

Aufz. Colibr. p. 14. — *Trochilus fuscus* Vieill. N. D. VII.

---

*) Die grössere orinocensische Rasse, welche nach Gould schmälere und bräunlichere Schwanzspitzen zeigt, trennt derselbe specifisch als:
F. flabellifera Bp. Consp. I. p. 74. gen. 168. 3. — Gould Mon. Troch. II. t. 11. — *Trochilus flabelliferus* Gould P. Z. S. 1846. p. 45 & p. 90. 19. — *Topaza flabellifera* Gray Gen. B. I. p. 110. 8. —

p. 348. — Id. Enc. p. 552. 16. — *Trochilus ater* Wied Reis. Bras. I. p. 366 & II. p. 136. — Id. Beitr. IV. p. 52. 2. — *Trochilus atratus* Licht. Doubl. p. 14. 113. — *Colibri leucopygius* Spix Av. Bras. I. p. 81. 3. t. 81. 3. — *Trochilus niger* Sws. Z. Ill. II. t. 82. — *Ornismya lugubris* Less. Ois. Mouch. p. 132. t. 38-39. — Id. Trait. p. 275. 14. — *Lampornis niger* Jard. Humm. B. II. p. 156. 8. — *Mellisuga atra* Steph. Gen. Z. XIV. p. 243. — *Topaza atra* Gray Gen. B. I. p. 110. 4. — *Florisuga atra* Bp. Consp. I. p. 74. gen. 168. 2. — Gould Mon. Troch. II. t. 12. — Burm. Th. Bras. II. p. 338. —

Brasilien — 3 ♂, 3 ♀ — 6 St.

Gen. LAMPROLAEMA Rchb. 1854. —

Lamprolaima (!) Rchb. 1854.

63. 1. L. Rhami Rchb.

Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XI. t. 9. — Scl. Ibis 1859. p. 129. 189. — *Ornismya Rhami* Less. R. Z. 1838. p. 315. 10. — Delattr. & Less. I. I. 1839. p. 13. — *Mellisuga Rhami* Gray Gen. B. I. p. 112. 24. — *Lampornis Rhami* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 13. — *Delattria Rhami* Id. Consp. Troch. p. 7. gen. 46. 170. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 287. 29. — Id. I. I. 8. Jun. 1858. B. fr. Oaxac. rec. by Sallé p. 5. 12. — *Heliodoxa Rhami* Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 746. 4712-13. — *Trochilus fulgidus* Licht. in Mus. Berol. —

Guatimala — ♂ — 1 St.

Gen. CLYTOLAEMA *) Gould 1853. —

Heliodoxa Rchb. 1854 (nec Gould 1849).

64. 1. C. rubinea Gould

Mon. Troch. VI. t. 2. — *Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil* Buff. Pl. enl. 276. 4 (ad.). — *Trochilus rubineus*

*) Nahe verwandt mit *Clytolaema* ist die westliche Gattung:

Phaeolaema Rchb. 1854 (*Phaiolaima* (!) Rchb. 1854. *Phoeolaema* (!) Bp. 1854):

1. *P. granadensis.* — *Trochilus rubinoides* (!) Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 322. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 11. — *Mellisuga rubi-*

Gm. S. N. p. 493. 46 (♂ ad.).— Lath. Ind. Orn. I. p. 312. 37. — Vieill. Enc. p. 568. 76.— Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 185. — *Trochilus obscurus* Gm. S. N. p. 495. 50 (♂ jun.). — Lath. Ind. Orn. I. p. 314. 44. — Vieill. Enc. p. 563. 55. — *Grand rubis s. Trochilus rubineus maior* Id. Ois. dor. I. p. 60. t. 27 (♂ ad.). — *Oiseau-mouche brun - gris* Id. l. l. I. p. 61. t. 28 (♂ jun.). — *Rubis - émeraude* Id. l. l. I.p. 114. — *Trochilus ruficaudatus* Id. N. D. VII. p. 370 & XXIII. p. 429 (♀). — *Ornismya rubinea* Less. Ois. Mouch. p. 146. t. 44 - 46. — Id. Trait. p. 278. 26. — *Cynanthus rubineus* Jard. Humm. B. II. p. 146. 19. — *Mellisuga rubinea* Gray Gen. B. I. p. 112. 22.— *Heliomaster rubineus* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 157. 4. — *Heliodoxa rubinea* Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 744. 4706-9. — *Calothorax rubineus* Burm. Th. Bras. II. p. 340. 2. —

Brasilien — 3 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., 2 ♀ — 7 St.

Subfam. HYLOCHARINÆ. Fliegenvögel.

Gen. LEUCIPPUS Bp. 1849 —

65. 1. L. chionogaster Gould

Mon. Troch. IX. t. 12. — *Trochilus (Lampornis) leucogaster* Tsch. (nec Lath.) Consp. p. 37. 209. — *Trochilus chionogaster* Id. Faun. Per. p. 247. 12. t. 22. 2. — *Trochilus Turneri* Bourc. R. Z. 1846. p. 313. — *Trochilus hypoleucus* Gould P. Z. S. 1846. p. 90. 16. — *Polytmus chionogaster* Gray Gen. B. I. p. 108. 56.— *Leucippus Turneri* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 165. 2. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 779. 4811. — *Thaumantias chionogaster* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 243. —

Bolivien — ♂; Peru — ♀ — 2 St.

---

noides (!) Gray Gen. B. I p. 112. 23. — *Heliomaster rubinoides* (!) Bp. Consp. I. p. 70. gen. 157. 5. — *Phaiolaima rubinoides* (!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 1.— *Clytolaema rubinoides* (!) Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 47. 173. — Scl. B. Bogot. p. 12. 100. — *Heliodoxa rubinoides* (!) Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 743. 4704-5 (Neu - Granada);

2. *P. aequatorialis* Gould MSS. (Ecuador). —

Gen. AGYRTRIA *) Rchb. 1854. —

Thaumatias (!) Gould 1852 & Burm. 1856 (nec Bp. 1849).
Leucochloris Rchb. 1854.

66. 1. A. albicollis Nob.

Trochilus albicollis Vieill. N. D. XXIII. p. 426. — Id. Enc. p. 558. 40. — Licht Doubl. p. 13. 112. — Temm. Pl. col. 203. 2. — Less. Man. Orn. II. p. 78. — Jard. Humm. B. II. p. 93 & p. 142. 28. — *Colibri albogularis* Spix Av. Bras. I. p. 81. 4. t. 82. 1. — *Trochilus vulgaris* Wied Beitr. IV. p. 72. 8 (juv.). — *Ornismya albicollis* Less. Man. Orn. II. p. 78. — Id. Ois. Mouch. p. 184. t. 63. — Id. Trait. p. 282. 45. — *Polytmus albicollis* Gray Gen. B. I. p. 108. 43. — *Thaumatias albicollis* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 7. — Burm. Th. Bras. II. p. 342. 1. — *Leucochloris albicollis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Gould Mon. Troch. X. t. 14. — *Thaumantias albicollis* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 240. — *Leucippus albicollis* Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 782. 4818-19. —
Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

67. 2. A. albiventris Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 757. 4744-45.— *Trochilus tephrocephalus* (!) Vieill. N. D. XXIII. p. 430. — Id. Enc. p. 560. 46. — Jard. Humm. B. II. p. 142. 27. — *Ornismya tephrocephala* (!) Less. Ois. Mouch.

---

*) Mit Unrecht glauben wir, führt Gray in seinem „Catalogue of Genera & Subgenera of Birds“ (p. 21 & 139. 313) *Agyrtria* Rchb. als Synonym von *Polytmus* Briss. und *Thaumatias* (!) Bp. auf; denn Reichenbach zählt zwar allerdings auch den *T. thaumantias* mit unter *Agyrtria* auf, aber dieser ist, wie die Abbildung (t. 756. 4738-39) hinlänglich zeigt, höchstens ein *T. thaumantias* Rchb. (nec Lin.) zu nennen, d. h. Nichts als *T. maculatus* Vieill. (= *T. viridissimus* Less. = *T. viridipectus* Saucerotte), eine von dem wahren, weiter oben erwähnten *T. thaumantias* Lin. himmelweit verschiedene Art. — Wir vereinigen nun hier unter der Benennung *Agyrtria* die meisten der von Bonaparte und Gould als *Thaumatias* oder *Thaumantias* aufgezählten Arten, welche zur Führung jenes Namens, als dessen Typus eben der wahre *T. thaumantias* Lin. anzusehen ist, wohl nicht berechtigt zu sein scheinen, sowie auch noch den von jenen schwerlich als *Leucochloris* Rchb. generisch zu sondernden *T. albicollis* Vieill., und stellen somit ausser den oben aufgeführten Arten u. a. noch folgende zu dieser Gattung:

7. *A. chionura*. — *Trochilus (Thaumatias) chionurus* Gould P. Z. S. 1850. p. 162. 2. — *Leucippus chionurus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 780. 4813-15. — *Thaumantias chionura* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 250. — *Thaumatias chionurus* Gould Mon. Troch. III. t. 15 (Veragua);

p. 182. t. 62. — Id. Trait. p. 282. 43. — *Ornismya albiventris* Id. Ois. Mouch. p. 209. t. 76. — Id. Troch. p. 94. t. 32. — Id. Trait. p. 283. 47. — *Trochilus albiventris* Jard. Humm. B. II. p. 141. 25. — *Polytmus thaumantias pt.* Gray Gen. B. I. p. 108. 40 (nec List Gen. B. p. 19). — *Thaumantias albiventris pt.* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 1. — Gould Mon. Troch. XII. t. 3. — *Coeligena tephrocephaia* (!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena tephrocephala* Id. Troch. Enum. p. 3. t.687. 4518. — *Thaumantias albiventris* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 241. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

68. 3. A. maculata Nob.

Oiseau-mouche à poitrine verte s. Trochilus maculatus Vieill. Ois. dor. I. p. 87. t. 44. — *Ornismya viridissima* Less. (nec Gm.) Ois. Mouch. p. 207. t. 75. — Id. Trait. p. 283. 46. — *Trochilus viridissimus* Jard. (nec Gm.) Humm B. II. p. 142. 29. — *Polytmus sp. pt.* Gray Gen. B. I. p. 108. 51. — *Trochilus viridipectus* Saucerotte in Mus. Berol. & Heinean. — *Saucerottia viridipectus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Agyrtria thaumantias* Id. (nec Lin.) l. l. p. 10.— Id. Troch. Enum. p. 7. t. 756. 4738-39.— *Chlorestes viridi-*

---

8. *A. candida.* — *Trochilus candidus* Bourc. & Delattr. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 326.— Id. R. Z. 1846. p. 316. 15. — *Polytmus candidus* Gray Gen. B. I. p. 108. 45. — *Thaumatias candidus* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 3. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 287. 36. — Id. l. l. 13. Jul. 1858. B. coll. by Taylor in Honduras no. 11. — Id. Ibis 1859. p. 130. 200. — *Thaumantias candidus* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 58. 251 (Guatimala);
9. *A. Malvinae.*— *Chlorestes Malvinae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7.— Id. Troch. Enum. p. 4. t. 696. 4550-51. — Von *A. maculata* nur durch die etwas geringere Grösse, den dunklern gestrecktern und an der Wurzel schmälern Schnabel und besonders durch die nicht weissen, sondern grünlichgrauen weiss gesäumten Unterschwanzdecken leicht unterscheidbar. — G. L. 3″ 9‴, Fl. 2″, Schwz. 1″ 1‴, Schnabelf. 10‴ (Brasilien);
10. *A. niveipectus.* — *Thaumatias chionopectus* (!) Gould Mon. Troch. XVIII. t. 8.— Unterscheidet sich nach Gould hauptsächlich von *A. leucogastra* durch die geringere Grösse, den schwarzen Schnabel, den glänzend bräunlichen Schwanz und die graulichern Unterschwanzdecken (Trinidad und Guiana);
11. *A. Milleri* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 759. 4752-53. — *Trochilus Milleri* „Lodd.“ Bourc. P. Z. S. 1847. p. 43. — Id. R. Z. 1847. p. 255.— *Polytmus Milleri* Gray Gen. B. I. p. 108. 46. — *Thaumatias Milleri* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 4. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 9. — *Thaumantias Milleri* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 248. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 19 (Neu-Granada);
12. *A. affinis.* — *Thaumatias affinis* Gould Mon. Troch. IX. t. 8. — Feiner und zarter gebaut als *A. brevirostris*, und durch einfarbig grüne Brust und Schwanz von derselben leicht zu unterscheiden (Rio-Janeiro). —

pectus Id. l. l. p. 4. t. 702. 4573-75. — *Hylocharis lactea fem.* (!!) Id. l. l. p. 8. t. 772. 4792. — *Thaumatias Linnaei* (!) Gould (nec Bp.) Mon. Troch. XII. t. 4. — *Coeligena Maugei fem.* (!!!) Rchb. (nec Vieill.) in Mus. Berol. —
Para — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

69. 4. A. leucogastra Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 762. 4762-64. — *Oiseau-mouche à cravate dorée de Cayenne* Buff. Pl. enl. 672. 3. — *Trochilus leucogaster* Gm. S. N. p. 495. 48. — Lath. Ind. Orn. I. p. 315. 46. — Vieill. Enc. p. 564. 61. — Licht. Doubl. p. 13. 111. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 179. — *Oiseau-mouche à gorge et ventre blanc* Vieill. Ois. dor. I. p. 86. t. 43. — *Ornismya albirostris* Less. Ois. Mouch. p. 212. t. 78. — Id. Trait. p. 283. 48.—*Cynanthus leucogaster* Jard. Humm. B. II. p. 149. 32. — *Polytmus mellisugus pt.* Gray Gen. B. I. p. 108. 41. — *Thaumatias mellisugus pt.* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 5. — *Thaumatias leucogaster* Id. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 244. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 7. — *Trochilus mellisugus* Burm. Th. Bras. II. p. 343. Anm. 1.—
Bahia — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

70. 5. A. brevirostris Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 759. 4749. — *Ornismya brevirostris* Less. Ois. Mouch. p. 211. t. 77. — Id. Trait. p. 283. 49. — *Trochilus versicolor* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 3. 27. t. 1. 1-3. — *Polytmus brevirostris* Gray Gen. B. I. p. 108. 44. — *Hylocharis versicolor* Id. l. l. I. p. 115. 45. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 9. — *Thaumatias brevirostris* Id. l. l. I. p. 78. gen. 181. 2. — Gould Mon. Troch. X. t. 7.— Burm. Th. Bras. II. p. 343. 2. — *Agyrtria versicolor* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 759. 4750-51.— *Thaumantias brevirostris* & *versicolor* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 246-47. —
Brasilien — ♂ ad., 4 ♂ jun., ♀ juv. — 6 St.

71. 6. A. mellisuga Nob.

Trochilus mellisugus Lin. (nec Vieill.) S. N. p. 192. 15. — Lath. Ind. Orn. I. p 313. 40. — *Oiseau-mouche de Cayenne* Buff. Pl. enl. 276. 3. — *Mellisuga concinna* Steph. — *Polytmus mellisugus pt.* Gray Gen. B. I. p. 108. 41. — *Trochilus bicolor fem.* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 178. — *Thaumatias mellisugus pt.* Bp. Consp. I. p. 78.

gen. 181. 5. — *Hylocharis mellisugus* Id. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 236. —
Similis *A. brevirostri*, sed paulo minor, rostro longiore; cauda nigrescente-caerulea, tectricibus subcaudalibus virescentibus. — Long. tot. 3″ 3‴, al. 1″ 8‴, caud. 1″ 1‴, rostr. culm. 7‴. —
Guiana *) — ♂ jun. — 2 St.

Gen. PYRRHOPHAENA **) Nob. —

Amazilis (!) Less. 1829. *Amizilis* (!) Gray 1840. *Lampornis* Tsch. 1844 (nec Sws. 1827). *Amazilia* (!) Rchb. 1849. *Amazilius* (!) Bp. 1849. *Amazillia* (!) Scl. & Salvin 1859.

72. 1. P. Amazilia Nob.

Orthorhynchus Amazili (!) Less. & Garn. Voy. Coqu. Ois. t. 31. 3.— *Ornismya Amazili* Less. Man. Orn. II. p. 81.— Id. Ois. Mouch. p. 67. t. 12-13.—Id. Trait. p. 280. 33.— *Phaëthornis Amazili* Jard. Humm. B. II. p. 152. 16.— *Trochilus (Lampornis) Amazilia* Tsch. Consp. p. 37. 206. — Id. Faun. Per. p. 246. 9. — *Polytmus Amazili* Gray Gen. B. I. p. 108. 70. — *Amazilius latirostris* (!) Bp. (nec Sws.) Consp. I. p. 77. gen. 180. 1. — *Amazilia latirostris* (!) Rchb. (nec Sws.) Aufz. Colibr. p. 10. — *Amazilia pristina* Gould Mon. Troch. XIII. t. 11. —
Peru — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

73. 2. P. leucophaea Nob.

Amazilia leucophaea Rchb. Aufz. Colibr. p. 10 & p. 24. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 11. — „*Trochilus Amazilicula* Saucerotte MSS.“ Rchb. — *Amazilia Amazilicula* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 777. 4805-6. —
Süd-Peru — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

---

*) Das berliner Museum besitzt Exemplare dieser Art von Guiana (Schomburgk) und Brasilien (Sello). —

**) Von πυῤῥός (röthlich) und φαίνω (leuchten, glänzen). — Wir stellen u. a. noch hierher:

6. *P. corallirostris.* — *Trochilus corallirostris* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 328. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 17. — *Amazilius corallirostris* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 180. 5. — *Amazilia corallirostris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 776. 4800-1. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 13. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 130. 197 (Guatimala);

74. 3. P. Riefferi Nob.

Trochilus Riefferi Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 45. — Id. R. Z. 1843. p. 103.— *Polytmus Riefferi* Gray Gen. B. I. p. 108. 72. — *Amazilius Riefferi* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 10. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 2. 12. — *Amazilia Riefferi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10.— Id. Troch. Enum. p. 8. t. 775. 4798-99. — *Trochilus arsinoides* Saucerotte in Mus. Berol. —

Long. tot. 4", al. 2" 1''', caud. 1" 5''', rostr. culm. 10'''.— Veragua — ♂; Neu-Granada — 2 ♂ — 3 St.

75. 4. P. Dubusi Nob.

Trochilus Dubusi Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1852. p. 141. — *Amazilia Dubusi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10.— Id. Troch. Enum. p. 8. t. 778. 4809-10. — *Amazilius Dubusi* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 52. 202.— ?*Amazillia Riefferi* Scl. & Salvin (nec Bourc.) Ibis 1859. p. 130. 198.— Veragua *) — ♂ — 1 St.

76. 5. P. beryllina Nob.

Trochilus beryllinus Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges.

---

7. *P. Dumerili.* — *Ornismya Dumerili* Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 172. t. 36. — *Polytmus Dumerili* Gray Gen. B. I. p. 109. 79. — *Amazilius Dumerili* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 180. 3. — „*Trochilus Amazilicula* Saucerotte MSS." Gould. — *Amazilia Dumerili* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 777. 4803-4 (Guayaquil);
8. *P. suavis* nov. sp. — Wie *P. Riefferi*, aber kleiner, mit kürzerm an der Wurzel breiterm Schnabel, weit kürzerm Schwanze, weniger goldig-grün glänzender Oberseite und etwas dunklerer Bauchfärbung. — G. L. 3" 6''', Fl. 1" 11''', Schwz. 1" 2½''', Schnabelf. 9'''. — Zwei von Warscewicz bei Cartagena gesammelte Exemplare im berliner Museum;
9. *P. cerviniventris.* — *Amazilius cerviniventris* Gould P. Z. S. 1856. p. 150. 1. — Scl. l. l. p. 287. 34. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 12 (Süd-Mexico: Cordova);
10. *P. Norrisi.* — *Trochilus Norrisi* Bourc. R. Z. 1847. p. 47. — *Polytmus Norrisi* Gray Gen. B. I. p. 108. 71. — *Amazilius Norrisi* Bp. Consp. p. 8. gen. 52. 204 (Guayaquil);
11. *P. Ocai.* — *Amazilia Ocai* Gould Ann. & Mag. Nat. Hist. 1859. IV. p. 96.— Kopf, Kehle und Brust glänzend grasgrün, Nacken und Oberrücken dunkler grün, Ober- u. Unter-Flügeldecken, Seiten, Unterrücken, Oberschwanzdecken und Schwanz grünlich-bronzefarben, Wurzeln der äussern Steuerfedern unten und der Armschwingen matt röthlich, Bauch hellbräunlich, Unterschwanzdecken hell bronzefarben, weiss gesäumt. — G. L. 4", Fl. 2" 3''', Schwz. 1" 4''', Schnabelf. 10''' (Xalapa). —

*) Das berliner Museum erhielt Exemplare dieser Art aus Costa-Rica, und glauben wir desshalb, die von Sclater a. a. O. für Guatimala angegebene *A. Riefferi* auf diese Art deuten zu müssen. —

v. Deppe & Schiede (Septemb. 1830) no. 26. — *Ornismya Arsinoë* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 28-29. — *Cynanthus Arsinoë* Jard. Humm. B. II. p. 149. 33.— *Polytmus Arsinoë* Gray Gen. B. I. p. 109. 75. — *Trochilus Devillei* Bourc. & Muls. R. Z. 1848. p. 272. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Amazilius Arsinoë* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 180. 2. — *Trochilus fuscicaudatus* „Fras." Licht. in Mus. Berol. (nec P. Z. S. 1840. p. 17). — *Saucerottia fuscicauda* Rchb. (nec Fras.) Aufz. Colibr. p. 8. — *Amazilia Arsinoë* Id. l. l. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 774. 4794-95. — *Amazilia Devillei* Id. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 778. 4807-8. — *Amazilius Devillei* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 52. 203. — *Chlorestes fuscicaudus* Rchb. (nec Fras.) Troch. Enum. p. 4. t. 696. 4552-53. —

M e x i c o — ♂ — 2 St.

Gen. HEMITHYLACA *) Nob. —

S a u c e r o t t i a (!) Bp. 1849. *E r y t h r o n o t a* (!) *) Gould 1858.

77. 1. H. n i v e i v e n t r i s Nob.

Trochilus niveoventer (!) Gould P. Z. S. 1850. p. 164.—*Saucerottia niveiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Thaumantias niveiventer* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 58. 252.— *Chlorestes niveiventris* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 700. 4566-67. — *Erythronota niveiventris* Gould Mon. Troch. XV. t. 15. —

V e r a g u a — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

78. 2. H e r y t h r o n o t a Nob.

Ornismya erythronota Less. Ois. Mouch. p. 181. t. 61. — Id. Trait. p. 282. 41.— *Trochilus erythronotus* Jard. Humm. B. II. p. 89. — *Cynanthus erythronotus* Id. l. l. II. p. 148. 26.— *Polytmus erythronotus* Gray Gen. B. I. p. 109. 78.— *Saucerottia erythronota* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 2.—

*) Von ἡμί (halb) und θύλακος (Hose). — Der Name Gould's kann keine Anwendung finden, da nicht alle hier vereinigten Arten wirklich rothrückig sind, und wir eine generische Trennung der eigentlichen *Erythronotae* von dem typischen *Saucerottiae* (!) für durchaus ungerechtfertigt erachten. Unter andern hierher zu stellenden Arten erwähnen wir hier nur:

9. *H. E d w a r d i.* — *Trochilus Edward* Delattr. & Bourc. R. Z. 1846. p. 308.— *Polytmus Edwardsii* (!) Gray Gen. B. I. p. 109. 77. — *Amazilius Edward*

Chlorestes erythronotus Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 699. 4562-63. —
Columbien — 7 ♂ ad., ♂ jun. — 8 St.

79. 3. H. viridiventris Nob.

Trochilus viridigaster (!) Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 42. — Id. R. Z. 1843. p. 103.— *Hylocharis viridigaster* (!) Gray Gen. B. I. p. 115. 41. — *Saucerottia viridiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8.— *Saucerottia viridigastra* (!) Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 54. 214. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 2. 14. — *Chlorestes viridiventris* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 699. 4564-65. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

80. 4. H. Hoffmanni *) nov. sp.

Maior; uropygio partim tectricibusque caudae superioribus totis violaceo - rufescentibus. — Long. tot. 4" 2"', al. 2" 3"', caud. 1" 6"'. rostr. culm. $9^1/_2$"'. —
Costa Rica — ♂ — 1 St.

81. 5. H. Warscewiczi *) nov. sp.

Minor; uropygio tectricibusque caudae superioribus caerule-

Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 13. — *Saucerottia Edwardsii* (!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 8.— *Thaumantias Edward* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 59. 253.— *Chlorestes Edwardsii* (!) Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 698. 4558-59. — *Erythronota Edwardi* Gould Mon. Troch. XV. t. 14 (Panama);

10. *H. Feliciae.* — *Ornismya Feliciae* Less. R. Z. 1840. p. 72. 6. — *Saucerottia Feliciae* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 54. 212 (Brasilien: San José);

11. *H. Sophiae.* — *Trochilus Sophiae* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 318. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 7. — *Polytmus Sophiae* Gray Gen. B. I. p. 109. 76. — *Amazilius Sophiae* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 12. — *Saucerottia Sophiae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Scl. B. Bogot. p. 13. 105. — *Chlorestes Sophiae* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 697. 4554-55 (Neu-Granada);

12. *H. Saucerottei.* — *Trochilus Saucerottii* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 311. — *Polytmus Saucerottii* Gray Gen. B. I. p. 108. 67. — *Saucerottia typica* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 1. — *Chlorestes typicus* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 701. 4569-70 (Neu-Granada);

13. *H. Aglaiae.* — *Trochilus Aglaiae* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 329. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 19. — *Polytmus Aglaiae* Gray Gen. B. I. p. 109. 73. — *Amazilia Aglaiae* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 11. — *Saucerottia Aglaiae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes Aglaiae* Id. Troch. Enum. p. 4;

14. *H. cyanura.* — *Amazilia cyanura* Gould Mon. Troch. XVIII. t. 12 (Realejo). —

*) Wir benennen diese beiden, der *H. caligata* so nahe verwandten Arten nach ihren Entdeckern, dem ja hinlänglich berühmten Reisenden Warscewicz und dem

scentibus nitore quodam violaceo - rufescente. — Long. tot. 3" 2‴, al. 1" 9‴, caud. 1" 1‴, rostr. culm. 7½‴. —
Veragua — ♂ — 2 St.

82. 6. H. caligata Nob.

Trochilus caligatus Gould P. Z. S. 1848. p. 14. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Saucerottia caligata* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 5.—*Saucerottia Feliciae* Rchb. (nec Less.) Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorestes Feliciae* Id. Troch. Enum. p. 8. t. 697. 4556-57. — *Chlorestes caligatus* Id. l. l. p. 8. —
Media; uropygio tectricibusque caudae superioribus unicoloribus caerulescentibus. — Long. tot. 3" 7‴, al. 2", caud. 1" 3‴, rostr. culm. 8½‴. —
Merida — ♂ — 1 St.

83. 7. H. cyanifrons Nob.

Trochilus cyanifrons Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 42. — Id. R. Z. 1843. p. 100. — *Polytmus cyanifrons* Gray Gen. B. I. p. 108. 66. — *Thalurania cyanifrons* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 178. 8. — *Saucerottia cyanifrons* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 15. — Gould Mon. Troch. XII. t. 15. — *Chlorestes cyanifrons* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 701. 4571-72. —
Veragua — ♂ ad.; Neu-Granada — ♂ ad., 2 jun. — 4 St.

84. 8. H. iodura Nob.

Trochilus iodurus Saucerotte in Mus. Heinean. — *Saucerottia iodura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes iodurus* Id. Troch. Enum. p. 4. t. 698. 4560-61. —
Capite, collo, pectore, dorso superiore tectricibusque alarum splendide virescentibus, gula paululum albo intermixta; alis caeruleo - virescentibus latissime pallide fulvescente - limbatis; cauda splendide purpureo - violacea; abdomine fulvescente; crisso albido. — Long. tot. 3" 3‴, al. 2", caud. 1" 2‴, rostr. culm. 9‴. —
Columbien — ♂ — 1 St.

Dr Hoffmann, der dem berliner Museum so viele neue und seltene naturhistorische Schätze aus dem bis dahin zoologisch fast noch ganz undurchforschten Costa Rica sandte. —

Gen. DAMOPHILA Rchb. (Mart.) 1854. —

Juliamyia (!) Bp. (Mai.) 1854. *Juliamya* (!) Gould 1859.

85. 1. D. amabilis Rchb.

Aufz. Colibr. p. 7. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 4. — *Trochilus amabilis* Id. P. Z. S. 1851. p. 115. — *Juliamya amabilis* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 59. 255. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 22. — *Coeligena amabilis* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 681. 4496-97. —
Neu-Granada — ♂ — 3 St.

86. 2. D. Juliae Rchb.

Rchb. Aufz. Colibr. p. 7.—*Ornismya Julie* (!) Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 345. t. 21. — Id. R. Z. 1842. p. 373. — *Hylocharis Juliae* Gray Gen. B. I. p. 114. 24. — *Juliamya typica* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 59. 254. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 21. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 3. — *Coeligena Juliae* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 681. 4494-95 & t. 763. 4767. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. LEPIDOPYGA *) Rchb. 1855. —

Hylocharis Bp. 1854 (nec Boie 1831).

87. 1. L. caeruleigularis Nob.

Trochilus caeruleogularis Gould P. Z. S. 1850. p. 163. 4.— *Cyanochloris caeruleigularis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia caeruleigularis* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 260. — *Agyrtria caeruleigularis* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 764. 4768-69. — *Trochilus cyanomelas* Licht. in Mus. Berol. — *Cyanophaia caerulescens* „Lodd.“ Rchb. in

*) Wir zählen zu dieser Gattung nur noch die beiden folgenden Arten:
2. *L. chlorocephala.* — *Hylocharis chlorocephala* Bourc. R. & Mag. Z. 1834. p. 457. — Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 226. — *Agyrtria chlorocephala* Rchb. Troch. Enum. p. 7 (Ecuador);
3. *L. Goudoti.* — *Trochilus Goudoti* Bourc. Ann. Soc. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 47. — Id. R. Z. 1843. p. 100. — *Polytmus Goudoti* Gray Gen. B. I. p. 108. 68. — *Saucerottia Goudoti* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 6. — *Chalybura Goudoti* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Hylocharis Goudoti* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 225. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 16. — *Agyrtria Goudoti* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 763. 4765-66 (Neu-Granada). —

Mus. Heinean. — ? *Hylocharis caerulescens* Id. Troch. Enum. p. 8. t. 770. 4785. —
Veragua — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. URANOMITRA *) Rchb. (Mai.) 1854. —

Cyanomyia (!) Bp. (Jun.) 1854.

88. 1. U. quadricolor Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus quadricolor* Vieill. Enc. p. 573. 90. — Jard. Humm. B. I. p. 99. t. 9.— Id. l. l. II. p. 136. 2. — Diezmann Colibr. p. 104. t. 9. — *Trochilus verticalis* Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 27-28.—*Ornismya cyanocephala* Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 132. t. 17. — *Polytmus quadricolor* Gray Gen. B. I. p. 109. 85. — *Cyanomyia verticalis* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 194.— *Cyanomyia quadricolor* Id. l. l. p. 8. gen. 51. 195. — Gould Mon. Troch. IX. t. 9.— *Agyrtria quadricolor* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 761. 4758-59. —
Mexico — ♂ — 1 St.

89. 2. U. Lessoni Nob.

Ornismya cyanocephala Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 134. t. 18 (nec p. 132. t. 17). — *Polytmus verticalis* Gray (nec Licht.) Gen. B. I. p. 109. 86.— ? *Uranomitra cyanocephala* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Cyanomyia cyanocephala* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 192.— Gould Mon. Troch. XI. t. 9. — Scl. Ibis 1859. p. 127. 183. — *Agyrtria Faustine* & *cyanocephala* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 760. 4754-57. —
Xalapa — ♂ — 2 St.

90. 3. U. Franciae Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Franciae* Bourc. & Muls.

---

*) Als zu dieser Gattung gehörig beschreibt Gould noch die drei folgenden Arten:
4. *U. cyanicollis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10.— *Trochilus cyanicollis* Gould P. Z. S. 1853. p. 61. 4. — *Cyanomyia cyanicollis* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 196. — *Agyrtria cyanicollis* Rchb. Troch. Enum. p. 7;
5. *U. violiceps.* — *Cyanomyia violiceps* Gould Ann. & Mag. Nat. Hist. 1859. IV. p. 97 (West-Mexico: Oaxaca);
6. *U. sordida.* — *Cyanomyia sordida* Gould Ann. & Mag. Nat. Hist. 1859. IV. p. 97 (West-Mexico: Oaxaca). —

Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 324. — Iid. R. Z. 1846. p. 316. 13. — *Polytmus Franciae* Gray Gen. B. I. p. 109. 87. — *Cyanomyia Franciae* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 193. — Scl. B. Bogot. p. 13. 103. — *Agyrtria Franciae* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 761. 4760-61. — *Trochilus hypoleucus* Licht. in Mus. Berol. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. CHRYSURISCA *) Nob. —

Chrysuronia (!) Bp. 1849.

91. 1. C. Oenone Nob.

Ornismya Oenone Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 157. t. 30. — Delattr. & Less. R. Z. 1839. p. 17. — *Cynanthus Oenone* Jard. Humm. B. II. p. 149. 34. — *Polytmus Oenone* Gray Gen. B. I. p. 109. 80. — *Chrysuronia Oenone* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 1.— Scl. P. Z. S. 1854. p. 111.— Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 722. 4644-45. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 11. —

Veragua — ♂, ♀; Caracas — ♂, ♀ — 4 St.

92. 2. C. Eliciae Nob.

Trochilus Eliciae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 314. — Iid. R. Z. 1846. p. 316. 3. — *Polytmus Eliciae* Gray Gen. B. I. p. 109. 82. — *Chrysuronia Eliciae* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 3. — Gould Mon Troch. XVI. t. 15. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 722. 4642-43. — Scl. Ibis 1859. p. 130. 201. —

Honduras — ♂ jun. — 1 St.

---

*) An die Stelle der an das griechische χρυσοῦρος gehängten latinisirten Endung *onia* setzen wir die griechische *isca* und rechnen zu dieser Gattung noch u. a. die folgenden Arten:

3. *C. Josephinae.* — *Ornismyia Josephinae* Bourc. & Muls. R. Z. 1848. p. 272. — *Trochilus Josephinae* Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Chrysuronia Josephinae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 13 (Ober-Amazonenstrom);
4. *C. Humboldti.* — *Trochilus Humboldtii* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 7. Mai. 1852. p. 142. — *Chrysuronia Humboldti* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 12 (Ecuador);
5. *C. chrysura.* — *Ornismya chrysura* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 4. — *Phaëthornis chrysura* Jard. Humm. B. II. p. 152. 15. — *Polytmus chrysurus* Gray Gen. B. I. p. 100. 81. — *Chrysuronia chrysura* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 2. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 721. 4640-41 (Brasilien). —

Gen. EUCEPHALA *) Rchb. 1854. —

93. 1. E. Grayi Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 12. — *Trochilus Grayi* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 307. — *Hylocharis Grayi* Gray Gen. B. I. p. 115. 38. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 772. 4789-91. — *Sapphironia Grayi* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 256. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. HYLOCHARIS **) Boie 1831. —

Sapphironia (!) Bp. 1854.

94. 1. H. sapphirina Gray

List Gen. B. p. 19. — Id. Gen. B. I. p. 115. 36. — Bp.

---

*) In die Nähe dieser Gattung gehört:

Panterpe insignis nov. gen. & nov. sp. — Glänzend goldgrün, Kopf etwas dunkler mit schön blauer Krone; an der Kehle fällt der Goldglanz des Gefieders stark in's Röthliche, und setzt sich nun dieser röthlich goldgrün glänzende Kehlfleck in einen allmählig abnehmenden und endlich ganz verschwindenden blauen Streifen auf der Brust fort; der Unterrücken und die Oberschwanzdecken sind glänzend blaulich-grün, der Schwanz dunkel schwarzblau, die Flügel bräunlich, die Unterschwanzdecken glänzend blaugrün, der Schnabel schwärzlich, nur die untere Hälfte des Unterschnabels bräunlich.—G. L. 4'' 3''', Fl. 2'' 6''', Schw. 1'' 9''', Schnabelf. 9'''. — Wir kennen nur das einzige aus Costa Rica von Dr. Hoffmann eingesandte Exemplar des berliner Museum's. —

Es bildet dieses prachtvolle Vögelchen den Typus einer neuen Gattung, welche, obschon im Allgemeinen in Grösse und Form noch *Eucephala* nahe kommend, doch sich hinlänglich von allen Verwandten, ja von der ganzen Subfamilie durch den ganz eigenthümlichen Schnabelbau auszeichnet. Derselbe ist nämlich ausnehmend dünn und schwach und zeigt sowohl des Ober- als des Unterschnabels Spitze leicht hakig, nach unten gekrümmt; ferner sind die Flügel ziemlich lang und stark entwickelt, der Schwanz dagegen ist mittelmässig, kaum das Ende derselben erreichend, aus ziemlich breiten Federn gebildet und fast gerade (nur die mittlern Steuerfedern sind unbedeutend kürzer). Die Kopffedern sind hier noch mehr entwickelt und noch glänzender als bei *Eucephala*. —

**) Ferner wird allgemein hierher gestellt:

H. lactea Gray Gen. B. I. p. 115. 37. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 2. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 773. 4789-91. — Burm. Th. Bras. II. p. 347. 2.— Gould Mon. Troch. XVIII. t. 13. — *Ornismya sapphirina* Less. Ois. Mouch. p. 172. t. 56. — *Ornismya lactea* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. 38. — *Trochilus sapphirinus* Wied (nec Gm.) Beitr. IV. p. 61. 4. — *Cyanochloris lactea* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia lactea* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 262. — *Trochilus lazulinus* Licht. in Mus. Berol (Brasilien). —

Consp. I. p. 74. gen. 169. 1. — Gould Mon. Troch. III. t. 12. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 769. 4780-82. — Burm. Th. Bras. II. p. 346. 1. — *Trochilus sapphirinus* Gm. S. N. p. 496. 52. — Lath. Ind. Orn. I. p. 313. 42. — Vieill. Enc. p. 570. 80. — Licht. Doubl. p. 14. 127. — Jard. Humm. B. I. p. 147. t. 28. — Diezmann Colibr. p. 140. t. 28. — *Trochilus fulvifrons* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 39. — *Sapphir* Vieill. Ois. dor. I. p. 73. t. 35 & p. 106. t. 58. — *Ornismya sapphirina* Less. Ois. Mouch. p. 172. t. 55 & 57. — Id. Trait. p. 280. 36. — Id. Troch. p. 53. t. 14. — *Trochilus latirostris* Wied Beitr. IV. p. 64. 5 (♂ ad.). — *Cynanthus sapphirinus* Jard. Humm. B. II. p. 147. 20. — *Hylocharis latirostris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia sapphirina* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 263.—

Brasilien — 4 ♂ ad., 3 ♂ jun., ♂ juv. — 8 St.

95. 2. H. cyanea Gray

Gen. B. I. p. 114. 31. — Gould Mon. Troch. III. t. 11. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 768. 4777-79. — Burm. Th. Bras. II. p. 348. 3. — *Trochilus cyaneus* Vieill. N. D. XXIII. p. 426. — Id. Enc. p. 558. 39. — Jard. Humm. B. I. p. 107. t. 7.— Id. l. l. II. p. 141. 24.— Diezmann Colibr. p. 100. t. 7. — *Trochilus azureus* Licht. Doubl. p. 14. 125-26. — *Ornismya cyanea* Less. Ois. Mouch. p. 199. t. 71. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 143. t. 23. — Id. Trait. p. 281. 40.— *Thaumatias cyanea* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 10. —

Brasilien — 7 ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ — 10 St.

96. 3. H. Doubledayi Gray

Gen. B. I. p. 114. 32. — *Trochilus Doubledayi* Bourc. P. Z. S. 1847. p. 46.— Id. R. Z. 1827. p. 259.— *Thaumatias Doubledayi* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 11. — *Trochilus lazulus* Licht. (nec Vieill.) in Mus. Berol. — *Cyanophaia lazula* Rchb. (nec Vieill.) Aufz. Colibr. p. 10. — *Cyanophaia Doubledayi* Id. l. l. p. 10. — *Sapphironia Doubledayi* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 264. — *Hylocharis lazula* Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 770. 4783-84. —

Rio Negro — ♂ — 1 St.

Gen. Basilinna Boie 1831. —

Basilina (!) Rchb. 1849. *Klais* Rchb. 1854. *Guimetia* (!) „Rchb." Bp. 1854. *Heliopaedica* Gould 1858. *Heliopedica* (!) Scl. & Salvin 1859.

97. 1. B. Guimeti Rchb.

Troch. Enum. p. 11. — *Trochilus Guimeti* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 38. t. 2. — Id. R. Z. 1843. p. 72. — *Hylocharis Guimeti* Gray Gen. B. I. p. 114. 33. — *Klaïs Guimeti* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 13. — *Myiabeillia (!) Guimeti* Bp. Consp. I. p. 7. gen. 41. 158. — *Myiabellia (!) Guimeti* Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 20. —

Veragua — ♂ ad.; Caracas — ♂ jun. — 2 St.

98. 2. B. leucotis Rchb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Trochilus leucotis* Vieill. N. D. XXII. p. 428. — Id. Enc. p. 559. 43. — *Trochilus leucocrotaphus* Shaw. — Jard. Humm. B. I. p. 137. t. 29. — Diezmann Colibr. p. 142. t. 29. — *Trochilus melanotus* Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 94. — *Ornismya Arsennii* Less. Ois. Mouch. p. 60. t. 9. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 27. — Id. Trait. p. 279. 32. — *Trochilus cuculiiger* Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 29. 31. — *Cynanthus leucotis* Jard. Humm. B. II. p. 144. 6. — *Hylocharis leucotis* Gray Gen. B. I. p. 114. 28. — *Thaumatias leucotis* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 8. — *Heliopaedica melanotis* Gould Mon. Troch. XV. t. 13. — *Heliopedica melanotis* Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 130. 202. —

Mexico — ♂ — 2 St.

Gen. Augastes Gould 1849. —

Trochilus Sws. 1827 & Jard. 1833 (nec Lin. 1748). *Lamprurus* Rchb. 1854. *Lumachellus* (!) Bp. 1854.

99. 1. A. superbus Bp.

Consp. I. p. 84. gen. 200. 1. — *Trochilus superbus* Vieill. Enc. p. 561. 49. — Jard. Humm. B. II. p. 94 & p. 136. 1. — *Trochilus scutatus* „Natt." Temm. Pl. col. 299. 3. — Less. Man. Orn. II. p. 80. — Jard. Humm. B. I. p. 110. t. 14. — Id. l. l. II. p. 138. 10. — Diezmann Colibr. p. 115. t. 14. — *Ornismya Nattereri* Less. Ois. Mouch. p. 75. t. 16. — Id. Trait. p. 284. 53. — *Hylocharis superba* Gray Gen. B. I. p. 114. 29. — *Augastes scutatus* Gould Mon. Troch. I. t. 15.— *Trochilus venustus* Licht. in Mus. Berol.—

Bahia — 2 ♂ ad., ♂ juv. — 3 St.

100. 2. A. lumachellus Bp.

Consp. I. p. 84. gen. 200. 2. — Gould Mon. Troch. II. t. 13. — *Ornismya lumachella* Less. R. Z. 1838. p. 315. — *Trochilus lumachellus* Bourc. R. Z. 1846. p. 313. — *Hylocharis lumachellus* Gray Gen. B. I. p. 114. 30.— *Lamprurus lumachellus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Ramphomicron lumachellus* Id. Troch. Enum. p. 10. —
Bahia — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. Chlorestes *) Rchb 1854. —

101. 1. C. cyanogenys Rchb.

Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 692. 4536-37. — *Trochilus cyanogenys* Wied Beitr. IV. p. 70. 7. — Jard. Humm. B. II. p. 89. — Burm. Th. Bras. II. p. 350. Anm. 1. — *Ornismya Wiedii* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 26. — *Cynanthus cyanogenys* Jard. Humm. B. II. p. 148. 28. — *Hylocharis cyanogenys* Gray Gen. B. I. p. 115. 40. — *Saucerottia cyanogenys* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 3. — *Hylocharis Wiedii* Id. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 234. —
Brasilien — 4 ♂ ad., ♂ jun. — 5 St.

Gen. Chlorostilbon *) Gould 1853. —

Cyanophaia *) Rchb. 1854. *Chlorostilbe* (!) Rchb. 1854.

102. 1. C. bicolor Nob.

Trochilus bicolor Gm. S. N. p. 496. 51. — Lath. Ind. Orn. I. p. 314. 43. — Vieill. Enc. p. 571. 81. — Licht. Doubl.

---

*) Als zweite Art stellt Reichenbach hierher:
C. caeruleus Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 693. 4534-35. — *Oiseau-mouche à gosier bleu s. Trochilus caeruleus* Vieill. Ois. dor. I. p. 82. t. 40. — Id. N. D. VII. p. 361. — Id. Enc. p. 563. 40. — Jard. Humm. B. II. p. 87. — *Ornismya Audeberti* Less. Ois. Mouch. p. 164. t. 51. — Id. Trait. p. 281. 37. — Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 310. t. 16. — *Trochilus Audeberti* Wied Beitr. IV. p. 67. 6. — *Cynanthus caeruleus* Jard. Humm. B. II. p. 147. 23. — *Hylocharis caerulea* Gray Gen. B. I. p. 114. 34. — Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 228. — *Thaumatias caeruleus* Id. Consp. I. p. 78. gen. 181. 12. — *Hylocharis Audeberti* Burm. Th. Bras. II. p. 349. 5. — *Eucephala caerulea* Gould Mon. Troch. XIV. t. 11 (Brasilien). —

*) Wir beschränken hier die Gattung *Chlorostilbon* Gould auf ihren ursprünglichen

p. 14. 123-24.— Jard. Humm. B. II. p. 84.— Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 178. — *Sapphir-émeraude* Vieill. Ois. dor. I. p. 75. t. 36.— *Picaflor mas bello* Azar. Apunt. no. 293.— *Trochilus splendidus* Vieill. N. D. VII. p. 321.— Id. Enc. p. 563. 56. — *Trochilus smaragdo-sapphirinus* Shaw. — *Ornismya bicolor* Less. Ois. Mouch. p. 161. t. 49-50. — Id. Trait. p. 280. 35. — Id. Troch. t. 16. — *Trochilus Audeberti var.* Wied Beitr. IV. p. 69. — *Cynanthus bicolor* Jard. Humm. B. II. p. 147. 22. — *Hylocharis bicolor* Gray Gen. B. I. p. 114. 35. — Burm. Th. Bras. II. p. 349. 4. — *Thaumatias bicolor* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 181. 13. — *Cyanophaia bicolor* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia bicolor* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 257. — *Trochilus flavifrons* „Lath." Licht. in Mus. Berol. (♂ sen.). —

Brasilien — ♂ sen. — 1 St.

103. 2. **C. nitidissimus Nob.**

Chlorostilbon prasinus Gould (nec Less.) Mon. Troch. V. t. 14. — *Trochilus nitidissimus* Licht. in Mus. Berol. — *Hylocharis prasina* Burm. (nec Less.) Th. Bras. II. p. 350. 6. — *Chlorestes nitidissimus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 693. 4538-39. — *Trochilus lamprus* „Natt." in Mus. Monac. — Pukerani Bon

Brasilien — 2 ♂ ad., 2 ♂ ad. var. — 4 St.

Gen. Chlorolampis *) Nob. —

Chlorostilbon Gould 1857 (nec 1853).

104. 1. **C. chrysogastra Nob.**

Trochilus chrysogaster Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 40. — Id. R. Z. 1843. p. 101. — *Hylo-*

Typus *C. prasinus* Gould (nec Less.) und verbinden damit die kaum generisch zu sondernde Gattung *Cyanophia* Rchb., während wir die von Gould später zu *Chlorostilbon* gestellten feinschnäbligen Arten als eigene Gattung *Chlorolampis* weiter unten aufführen. —

*) Von χλωρός (grün) und λάμπω (leuchten, glänzen). — Zu dieser vor Allem durch den feinern, dünnern Schnabel von der vorigen ausgezeichneten Gattung stellen wir ausser den oben aufgeführten u. a. noch:

4. *C. Caniveti.* — *Ornismya Canivetii* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 37-38. — *Cynanthus Canivetii* Jard. Humm. B. II. p. 145. 12. — *Hylocharis Canivetii* Gray Gen. B. I. p. 114. 19.— *Thaumatias Caniveti* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 9. — *Riccordia Canivetii* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Sporadinus Cani-*

charis chrysogaster Gray Gen. B. I. p. 115. 43. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 2. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 17. — *Chlorestes chrysogaster* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 693. 4540-41. — *Chlorestes prasinus fem.* Id. l. l. t. 755. 4737.— *Chlorostilbon Canniveti* Gould (nec Less.) Mon. Troch. XVI. in text. ad tab. 14. — *Trochilus puber* Siebold in Mus. Monac. — Long. tot. 3" 3‴, al. 1" 9‴, caud. 1" 2‴, rostr. culm. 8‴. —

Neu-Granada — ♂; Peru — 2 ♂, ♀ — 4 St.

105. 2. C. Salvini Nob.

Chlorostilbon Canevetii Scl. & Salvin (nec Less.) Ibis 1859. p. 130. 204. —

Intermedia quasi colore inter *C. Haeberlini* et *C. chrysogastram*, maior autem utraque caudaque magis elongata *C. auricipiti* similis: supra subtusque minus aurato - virescens quam *C. chrysogastra*, minus caerulescente - quam *C. Haeberlini*; caudae caerulescenti - nigrae apicibus virescentibus; rostro fusco, mandibulae dimidio basali albido. — Long. tot. 3" 6", al. 1" 10‴, caud. 1" 5‴, rostr. culm. $7^1/_2$‴. —

Costa Rica — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

106. 3. C. smaragdina Nob.

Simillima *C. chrysogastrae*, sed paulo minor, cauda vix furcata, supra subtusque nitore virescente minus aurato. — Long. tot. 3", al. 1" 7‴, caud. 1‴, rostr. culm. 7‴. —

Venezuela — ♂ — 1 St.

---

veti Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 224.— *Chlorestes Canivetii* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 703. 4581-83 (Brasilien);

5. *C. phaëthon.* — *Trochilus phaëthon* Bourc. R. Z. 1848. p. 274. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a.— *Chlorestes phaëthon* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7.—Id. Troch. Enum. p. 4. t. 755. 4734-35. — *Hylocharis phaëthon* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 56. 229 (Bolivien);

6. *C. Haeberlini.* — *Trochilus Haeberlini* Licht. in Mus. Berol.— *Chlorestes Haeberlini* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7.—Id. Troch. Enum p. 4. t. 703. 4578-80.— Wie *C. chrysogastra*, aber weniger gelblich-, als vielmehr (besonders auf der Brust) blaulich-grün glänzend und mit tiefer gegabeltem Schwanze. — G. L. 3" 4‴, Fl. 1" 6‴, Schwz. 1" 4‴, Schnabelf. 7‴ (Cartagena);

7. *C. auriceps.* — *Ornismya Canivetii* Delattr. & Less. (nec Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 37-38) R. Z. 1839. p. 15. — *Trochilus auriceps* Gould Contrib. Orn. 1852. p. 137. — *Sporadinus auriceps* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 223. — *Chlorostilbon auriceps* Gould Mon. Troch. XIII. t. 14. — *Trochilus modestus* Licht. in Mus. Berol. (Mexico). —

Gen. Prasitis *) nov. gen. —

107. 1. **P. prasina** Nob.

Ornismya prasina Less. Ois. Mouch. p. 188. t. 65. — Id. Trait. p. 284. 50. — *Trochilus prasinus* Jard. Humm. B. I. p. 97. t. 8 & II. p. 141. 23. — Diezmann Colibr. p. 102. t. 8. — *Hylocharis prasina* Gray Gen. B. I. p. 114. 46. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 10. — *Chlorestes prasinus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 691. 4529-30. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — ♂ — 2 St.

108. 2. **P. phaeopyga** Nob.

Trochilus (Lampornis) phaeopygus „Licht." Tsch. Consp. p. 37. 208. — Id. Faun. Per. p. 247. 11. — *Polytmus phaeopygus* Gray Gen. B. I. p. 109. 83. — *Chrysuronia phaeopyga* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 4. —

Peru — ♀ — 1 St.

Gen. Panychlora **) Nob. —

Smaragditis pt. Rchb. 1854. *Chlorostilbon* Bp. 1854 (nec Gould 1853).

109. 1. **P. euchloris** Nob.

Smaragditis euchloris Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorestes euchloris* Id. l. l. p. 23. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 694. 4544. —

Long. tot. 3", al. 1" 8½''', caud. 9''', rostr. culm. 9½'''. —

Nord-Peru — ♂ — 1 St.

---

*) Von πρασῖτις (dem Lauch an Farbe ähnlich). — Wir kennen nur die beiden oben aufgeführten, durch den runden Schwanz hinlänglich vor ihren gabelschwänzigen Verwandten ausgezeichneten Arten dieser Gattung. —

**) Von πάνυ (gar sehr) und χλωρός (grün). — Wir zählen hierher alle die kleinen grünschwänzigen von Reichenbach mit *Polytmus Theresiae* unter der Benennung *Smaragditis* vereinigten Arten, also auch u. a. noch:

4. *P. maculicollis.* — *Smaragditis maculicollis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorestes maculicollis* Id. l. l. p. 23. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 694. 4545-46 (Neu-Granada);

5. *P. Mariae.* — *Trochilus Mariae* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. . . . — Id. R. Z. 1846. p. 316. 8. — *Hylocharis Mariae* Gray Gen. B. I. p. 115. 42. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 6. — *Smaragditis Mariae*

110. 2. P. aurata nov. sp.

Praecedenti simillima colore, sed minor rostroque multo breviore robustiore, insequenti simillima statura, sed supra subtusque magis aurata. — Long. tot. 2″ 7‴, al. 1″ 6‴, caud. 10‴, rostr. culm. 7‴. —

Peru — ♂ — 2 St.

111. 3. P. Poortmanni Nob.

Ornismya Poortmanni Bourc. R. Z. 1843. p. 2. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 39. — *Hylocharis Poortmanni* Gray Gen. B. I. p. 115. 48. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 11. — Scl. B. Bogot. p. 13. 106. — *Chlorestes Poortmanni* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 691. 4531-32.— *Ornismya esmeralda* „Less.“ in Mus. Heinean. & Berol. — *Smaragditis esmeralda* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorostilbon Poortmanni* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 57. 238.— *Chlorostilbon esmeralda* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 694. 4542-43. —

Long. tot. 2″ 10‴, al. 1″ 7‴, caud. 11‴, rostr. culm. 8‴. —

Neu-Granada — ♂ — 3 St.

Gen. AÏTHURUS *) Nob. —

Phoetornis (!) Less. 1829 (nec Sws. 1827). *Polythmus* (!) Id. 1832 (nec Briss. 1760). *Trochilus* Gray 1840 & Gould 1849 (nec Lin. 1748).

112. 1. A. polytmus Nob.

Trochilus polytmus Gm. S. N. p. 189. 4. — Lath. Ind.

Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Saucerottia Maria* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 54. 216. — *Chlorestes Mariae* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 695. 4549 (Venezuela);

6. *P. Aliciae.* — *Trochilus Alice* (!) Bourc. R. Z. 1848. p. 274. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Smaragditis Alice* (!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorostilbon Aliciae* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 57. 239. — *Chlorestes Alice* (!) Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 754. 4732-33. — *Trochilus crypturus* Licht. in Mus. Berol. (Venezuela);

7. *P. stenura* nov. sp.— Grösser als *P. Aliciae* und im Allgemeinen weniger gelblich-grün glänzend, nur der Rücken und die Flügeldecken zeigen einen stark goldglänzenden Anflug, schon weniger der Kopf, die Oberschwanzdecken und der durch die auffallend schmalen drei Aussenfedern ausgezeichnete Schwanz, während die ganze Unterseite prachtvoll smaragd - grün leuchtet. — G. L. 3″ 1‴, Fl. 1″ 8‴, Schwz. 1″, Schnabelf. 8‴. — Nur ein Exemplar im berliner Museum aus Merida. —

*) Von ἀείθουρος (stets kampflustig). —

Orn. I. p. 302. 4.— Vieill. Enc. p. 554. 23.— Jard. Humm. B. II. p. 108. t. 21. — Gray Gen. B. I. p. 109. 1. — Gosse B. Jamaic. p. 97. — Id. Ill. B. Jamaic. t. 19. — Gould Mon. Troch. I. t. 1. — *Ornismya cephalatra* (!) Less. Ois. Mouch. p. 78. t. 17. — Id. Trait. p. 275. 15. — *Cynanthus polytmus* Jard. Humm. B. II. p. 145. 13. — *Polytmus cephalater* (!) Bp. Consp. I. p. 72. gen. 162. 1. — ? *Polytmus nov. sp.* („*Trochilus stellatus* Gosse") Id. l. l. p. 72. gen. 162. 2. — *Polytmus viridans* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 799. 4858-60. —

Jamaica — ♂ — 2 St.

Subfam. TROCHILINÆ. Colibris.

Gen. Entima *) Nob. —

Calothorax Gray 1848 (nec 1840). *Lafresnaya* (!) Bp. 1849.

113. 1. **E. Lafresnayi Nob.**

Trochilus Lafresnayi Boiss. R. Z. 1840. p. 8. 16. — *Trochilus flavicaudatus* Fras. P. Z. S. 1840. p. 18. — Burm. Th. Bras. II. p. 341. Anm. 1. — *Calothorax Lafresnayi* Gray Gen. B. I. p. 110. 1. — *Lafresnaya flavicaudata* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 150. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 785. 4824-25. — Scl. B. Bogot. p. 12. 83. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 3. —

Neu-Granada — 4 ♂ ad., ♂ jun. — 5 St.

114. 2. **E. Gayi Nob.**

Trochilus Gayi Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 325. — Iid. R. Z. 1846. p. 316. 14. — *Trochilus Saulae* Bourc. R. Z. 1846. p. 309. — *Calothorax Gayi* Gray Gen. B. I. p. 110. 2. — *Calothorax Saulae* Id. l. l. I. p. 110. 3. — *Lafresnaya Gayi* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 150. 2. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 786. 4826-27. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 4. — *Lafresnaya Saulae* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 150. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 787. 4828-29. — *Lafresnaya Saul* (!) Id. Aufz. Colibr. p. 11. —

Peru — ♂ — 1 St.

*) Von ἔντιμος (*honoratus*). —

Gen. SPARGANURA *) Nob. —

Cynanthus Tsch. 1844 (nec Sws. 1827). *Cometes* Gould 1847 (nec Hodgs. 1849). *Sappho* (!) Rchb. 1849. *Lesbia* Bp. 1854 (nec Less. 1832).

115. 1. S. Sappho Nob.

Trochilus sparganurus Shaw Gen. Z. VIII. p. 291. 11. t. 39. — Jard. Humm. B. II. p. 112. 23. — *Trochilus chrysurus* Cuv. Règn. Anim. I. p. 436. — *Ornismya Sapho* Less. Man. Orn. II. p. 83. — Id. Ois. Mouch. p. 105. t. 27-28. — Id. Trait. p. 272. 3.— *Cynanthus sparganurus* Jard. Humm. B. II. p. 146. 17.— *Orthorhynchus chrysurus* Orb. & Lafr. Syn. p. 26. 3. — *Trochilus (Cynanthus) chrysurus* Tsch. Consp. p. 36. 200. — Id. Faun. Per. p. 214. 3.— *Cometes Sappho* Gould P. Z. S. 1847. p. 31. 1.— *Mellisuga sparganura* Gray Gen. B. I. p. 113. 46. — *Cometes sparganurus* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 188. 1. — Gould Mon. Troch. IV. t. 2. — *Sappho sparganura* Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 724. 4651-52. — *Lesbia sparganura* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 34. 130.— *Trochilus radiosus* Temm. in Mus. Lugd. —

Bolivien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. PSALIDOPRYMNA **) Nob. —

Cynanthus Bp. 1854 (nec Sws. 1827). *Lesbia* Gould 1854 (nec Less. 1832).

116. 1. P. Victoriae Nob.

Trochilus Victoriae Bourc. R. Z. 1846. p. 315. t. 4. —

---

*) Dieser prachtvollen Gattung, zu deren Genus-Namen wir den so bezeichnenden Species-Namen Shaw's *Sparganura* (von σπαργάω, schwelgen, strotzen, und οὔρα, Schwanz) erheben, werden noch gezählt:

2. *S. Phaon.* — *Cometes Phaon* Gould P. Z. S. 1847. p. 31. 2. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 188. 2. — Gould Mon. Troch. IV. t. 3. — *Mellisuga Phaon* Gray Gen. B. I. p. 113. 47. — *Sappho Phaon* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 725. 4653-54. — *Lesbia Phaon* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 34. 131 (Peru);

3. *S. Mossai.* — *Cometes Mossai* Gould Athen. 24. Sept. 1853. p..... — Id. Rep. Brit. Assoc. 1853. p. 68.— *Lesbia glyceria* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 34. 134. — *Cometes glyceria* Gould Mon. Troch. XV. t. 12 (Popayan). —

**) Von ψαλίς (Scheere) und πρύμνη (Hintertheil, Schwanz). — Ausserdem stellen wir noch hierher:

Mellisuga Victoriae Gray Gen. B. I. p. 103. 54. — *Cynanthus Victoriae* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 6. — *Lesbia Victoriae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 715. 4622-23. —
Neu-Granada — ♂ — 3 St.

117. 2. P. bifurcata Nob.

Cynanthus bifurcata Sws. Syn. B. Mexic. p. 411. 97. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 2. — *Ornismya nuna* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 35. — Id. R. Z. 1838. p. 314. 4. — *Trochilus nuna* Jard. Humm. B II. p. 114. — *Cynanthus nuna* Id. l. l. II. p. 146. 18. — *Mellisuga bifurcata* Gray Gen. B. I. p. 113. 48. — *Lesbia bifurcata* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 716. 4624-25. —
Peru — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. Heliomaster Bp. 1849. —

Trochilus Sws. 1837 (nec Lin. 1748). *Lepidogaster, Calliperidia* & *Lepidolarynx* Rchb. 1854. *Heliomastes* (!) & *Ornithomyia* Bp. 1854. *Callopistria* (!) Bp. 1854.

118. 1. H. squamosus Nob.

Trochilus squamosus Temm. Pl. col. 203. 1 (juv.). — Jard. Humm. B. II. p. 92 & p. 136. 4. — Less. Man. Orn. II. p. 79. — *Trochilus mesoleucus* Temm. Pl. col. 317. — Jard. Humm. B. II. p. 91. t. 17 & p. 136. 3. — Less. Man. Orn. II. p. 79. — *Ornismya Temminckii* Less. Ois. Mouch. p. 88. t. 20. — *Ornismya mesoleuca* Id. l. l. p. 110. t. 29-30. — Id. Trait. p. 278. 25. — *Mellisuga squamosa* Steph. Gen. Z. XIV. p. 245. — *Mellisuga mesoleuca* Id. l. l. XIV. p. 246. — *Mellisuga melanoleuca* (!) Gray Gen. Gen. B. I. p. 112. 15. — *Heliomaster mesoleucus* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 157. 3. — Gould Mon. Troch. V. t. 13. — *Lepidolarynx mesoleucus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornithomyia mesoleuca* Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 24. 87. — *Selasphorus mesoleucus* Rchb. Troch.

3. *P. Amaryllis.* — *Trochilus Amaryllis* Bourc. R. Z. 1848. p. 273. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Cynanthus Amaryllis* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 35. 136. — *Lesbia Amaryllis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Gould Mon. Troch. VII t. 1.— Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 714. 4620-21.— Scl. B. Bogot. p. 12. 93 (Neu-Granada, Ecuador und Peru). —

Enum. p. 11. — *Calothorax mesoleucus* Burm. Th. Bras. II. p. 339. 1. — *Trochilus mystacinus* Vieill. MSS. — *Trochilus longirostris* Natt. (nec Vieill.) in Mus. Vindob. —
Brasilien — 2 ♂ ad., 3 ♂ juv. — 5 St.

119. 2. H. longirostris Bp.

Consp. I. p. 70. gen. 157. 2.—Gould Mon. Troch. V. t. 9. — *Oiseau-mouche à long bec s. Trochilus longirostris* Vieill. Ois. dor. I. p. 107. t. 59. — Id. N. D. VII. p. 366. — Id. Enc. p. 566. 68. — Sws. Class. B. II. p. 330. — Burm. Th. Bras. II. p. 341. Anm. 2. — *Trochilus superbus* Shaw Nat. Misc. XIII. t. 517. — Id. Gen. Z. VIII. p. 323. t. 41. 2. — Temm. Pl. col. 299. 1. — Jard. Humm. B. II. p. 94. — *Ornismya superba* Less. Ois. Mouch. p. 40. t. 2. — Id. Colibr. p. 164. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 53. — Id. Trait. p. 278. 28. — Id. Troch. p. 99. t. 34. — *Mellisuga longirostris* Gray Gen. B. I. p. 112. 4. — *Selasphorus longirostris* Rchb. Troch. Enum. p. 11. — *Heliomastes longirostris* Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 23. 83. — *Selasphorus longirostris* Rchb. Troch. Enum. p. 11. —
Medius, rostro breviore: supra splendide virescens, pileo paululum tantummodo margine caeruleo-nitenti, subtus gula purpurascente aliquantulum in flavum vergente.— Long. tot. 4″ 6‴, al. 2″ 4‴, caud. 1″ 5‴, rostr. culm. 1″ 2‴. —
Cayenne — ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 3 St.

120. 3. H. Constanti Gould

Mon. Troch. V. t. 10. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 190. — *Trochilus Constanti* Delattr. Echo Mond. Sav. Jun. 1843. p. .... — *Heliomaster Constanti* Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 23. 84. — *Selasphorus Constanti* Rchb. Troch. Enum. p. 11. —
Maior, rostro longiore: supra aurato - virescens, pileo haud nitenti; subtus gula pulchre rubra. — Long. tot. 5″, al. 2″ 6‴, caud. 1″ 6‴, rostr. culm. 1″ 5‴. —
Costa Rica — ♂ — 1 St.

121. 4. H. Sclateri Nob.

?*Heliomaster longirostris* Scl. (nec Bp.) B. Bogot. Add. II. p. 11. —
Minor, rostro longiore: supra cupreo - virescens, pileo splendide caeruleo - nitenti, subtus gula purpurea. — Long. tot. 4″ 3‴, al. 2″ 2‴, caud. 1″ 3‴, rostr. culm. 1″ 4‴. —
Venezuela — ♂ — 2 St.

Gen. CALOTHORAX *) Gray 1840. —

Callithorax Agass. 1848. *Lucifer* Rchb. 1854. *Cyanopogon* Bp. 1854.

122. 1. C. lucifer Gray

List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 110. 10. — Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 1. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 1. — *Cynanthus lucifer* Sws. Syn. B. Mexic. p. 442. 99. — Jard. Humm. B. II. p. 143. 2. — *Ornismya cyanopogon* Less. Ois. Mouch. p. 50. t. 5. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 117. t. 9 & p. 119. t. 10. — Id. Trait. p. 274. 9. — *Trochilus coruscus* Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 34-35. — *Trochilus cyanopogon* Jard. Humm. B. II. p. 92. t. 15. — *Trochilus lucifer* Id. l. l. II. p. 79. — *Lucifer cyanopogon* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. —

Mexico — 3 ♂, 3 ♀ — 6 St.

Gen. ATTHIS Rchb. 1854. —

Calypte Gould 1856.

123. 1. A. Annae Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — *Ornismya Anna* Less. Ois. Mouch. p. 205. t. 74. — Id. Trait. p. 281. 39. — *Trochilus Anna* Jard. Humm. B. I. p. 93. t. 6 & II. p. 141. 23. — Diezmann Colibr. p. 98. t. 6. — Aud. B. N.-Amer. V. p. 238. t. 425. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 170. 252. — *Trochilus icterocephalus* Natt. Man. I. p. 712. — *Mellisuga Anna* Gray Gen. B. I. p. 113. 61. — *Calliphlox Anna*

---

*) Nahe verwandt ist die zwischen *Heliomaster* und *Calothorax* gleichsam den Uebergang bildende Gattung:

Rhodopis Rchb. 1854, mit der einzigen Art:

R. vespera Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — Gould Mon. Troch. IX. t. 8. — *Ornismya vesper* Less. Ois. Mouch. p. 85. t. 19. — Id. Trait. p. 273. 7. — Id. Troch. p. 33. t. 11. — Id. R. Z. 1838. p. 14. — *Trochilus vesper* Jard. Humm. B. I. p. 127. t. 24. — Diezmann Colibr. p. 132. t. 24. — *Cynanthus vesper* Jard. Humm. B. II. p. 144. 7. — *Calothorax vesper* Gray Gen. B. I. p. 110. 13. — *Thaumastura vesper* Bp. Consp. I. p. 85. gen. 203. 2. — *Lucifer vesper* Id. Consp. Troch. p. 11. gen. 73. 290. — *Calliphlox vespera* Rchb. Troch. Enum. p. 10 (Süd-Peru). —

Gambel Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1856. p. 112. — Cab. Wiegm. Arch. f. Nat.-Gesch. XIV. 1. p. 94. — *Selasphorus Anna* Bp. Consp. I. p. 82. gen. 192. 2. — *Calypte Annae* Gould Mon. Troch. XI. t. 5. — *Trochilus lamprocephalus* Licht. in Mus. Berol. —

Californien — ♂ — 1 St.

Gen. Selasphorus Sws. 1832. —

Calliphlox Gambel 1846 (nec Boie 1831). *Selosphorus* (!) Bp. 1849. *Selasopherus* (!) Rchb. 1855.

124. 1. S. platycercus Bp.

Consp. I. p. 82. gen. 192. 3. — Gould Mon. Troch. III. t. 7. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 193. — *Trochilus platycercus* Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 95.— Jard. Humm. B. II. p. 73. — *Ornismya tricolor* Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 125. t. 14. — Id. Troch. p. 156. t. 60. — Jard. Humm. B. II. p. 77. t. 13. — *Ornismya montana* Less. Troch. p. 161. t. 63-64. — *Trochilus montanus* Jard. Humm. B. II. p. 67. — *Cynanthus tricolor* Id. l. l. II. p. 144. 8. — *Mellisuga platycerca* Gray Gen. B. I. p. 113. 78. —

Mexico — ♂ — 4 St.

125. 2. S. scintilla Gould

P. Z. S. 1850. p. 164. — Id. Mon. Troch. III. t. 6. —

Veragua — ♂ — 1 St.

126. 3. S. ruber Bp.

Consp. I. p. 82. gen. 192. 1. — *Trochilus ruber* Lin. S. N. p. 193. 21. — Lath. Ind. Orn. I. p. 315. 48. — Vieill. Enc. p. 563. 74. — Brandt Icon. Av. Ross. t. 1. 2. — *Trochilus rufus* Gm. S. N. p. 497. 57. — Jard. Humm. B. II. p. 71. t. 11 & p. 141. 22. — Aud. B. N.-Amer. IV. p. 324. t. 379. — *Trochilus collaris* Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 59. — Vieill. Ois. Amér. Sept. II. p. 75. — *Sasin* Id. Ois. dor. I. p. 110. t. 61 & p. 111. t. 62. — *Oiseau-mouche pourpré* Id. l. l. I. p. 117. — *Ornismya sasin* Less. Ois. Mouch. p. 190. t. 66-67. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 121. t. 11-13.— Id. Trait. p. 281. 38. — Id. Troch. p. 117. t. 43. — *Trochilus (Selasphorus) rufus* Sws. Faun. Bor. Amer. II. p. 324. 113.— *Selasphorus rufus* Id. l. l. p. 495.— Aud. Syn. B. N.-Amer. p. 171. 254. — Gould Mon. Troch. III. t. 5. — *Calliphlox rufa* Gambel Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1846.

p. 111.— Cab. Wiegm. Arch. f. Nat.-Gesch. XIV. 1. p. 93.— *Mellisuga rubra* Gray Gen. B. I. p. 113. 60. —
Californien — ♂ — 2 St.

Gen. TROCHILUS Lin. 1748. —

Cynanthus Sws. 1827. *Colubris* Rchb. 1849. *Archilochus* Id. 1854.

127. 1. T. colubris Lin.

S. N. p. 191. 12. — Lath. Ind. Orn. I. p. 312. 38.— Vieill. Enc. p. 569. 78. — Wils. Amer. Orn. II. p. 26. t. 10. 3-4. — Jard. Humm. B. I. p. 85. t. 5. — Diezmann Colibr. p. 89. t. 5. — Aud. B. N.-Amer. I. p. 248. t. 47. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 170. 253. — Sagra Voy. Cub. t. 21. 1. — Richards. Faun. Bor. Amer. II. p. 323. 112. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 189. 1. — Gould Mon. Troch. XV. t. 4. — Baird Rep. Explor. & Surv. for Pacif. Railr. IX. 2. p. 131. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 195. — *Rubis* Vieill. Ois. dor. I. p. 66. t. 31, p. 69. t. 32 & p. 70. t. 33.— Id. Ois. Amér. Sept. I. t. 31-32.— *Ornismya colubris* Less. Ois. Mouch. p. 151. t. 48-48b. — Id. Troch. p. 1. t. 1. — *Cynanthus colubris* Jard. Humm. B. II. p. 143. 1. — *Mellisuga colubris* Steph. Gen. Z. XIV. p. 247. — Gray Gen. B. I. p. 113. 82. —
Nord-America — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

128. 2. T. Alexandri Bourc.

Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 330. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 20. — Hermann Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 1853. p. 269. — Cassin B. Calif. p. 141. t. 22.*) — Baird Rep. Explor. & Surv. IX. 2. p. 133. — *Mellisuga Alexandri* Gray Gen. B. I. p. 113. 80.— *Archilochus Alexandri* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13.— *Selasphorus Alexandri* Id. Troch. Enum. p. 10. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 4. — „*Trochilus Cassini* Bp.“ Id. l. l. XIV. in text. ad tab. 4.— *Trochilus suecicus* in Mus. Götzian. Dresd.—
Mexico — ♂ — 1 St.

---

*) Cassin beschreibt sonderbarer Weise a. a. O. weder das Schwarz der Kehle, noch bildet er es ab, und scheint dadurch Bonaparte zu der Annahme die californische Art sei wegen ihrer einfarbigen Kehle als *T. Cassini* specifisch zu trennen, veranlasst zu haben. —

Gen. CALLIPHLOX Boie 1831. —

Tryphaena Bp. 1854 (nec Ochsenheimer 1816).

129. 1. C. amethystina Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — Gould Mon. Troch. XII. t. 14. — *Petit oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne* Buff. Pl. enl. 672. 1. — *Trochilus amethystinus* Gm. S. N. p. 496. 54. — Lath. Ind. Orn. I. p. 319. 62. — Vieill. Enc. p. 561. 50. — Wied Beitr. IV. p. 90. 13. — Jard. Humm. B. II. p. 64. t. 9. — *Oiseau-mouche améthyste* Vieill. Ois. dor. I. p. 115. — *Trochilus brevicauda* Spix Av. Bras. I. p. 79. 2. t. 80. 2 (♀ an ♂ juv.). — *Ornismya amethystina* Less. Ois. Mouch. p. 150. t. 47. — Id. Troch. p. 90. t. 30 & p. 140. t. 52. — Id. Trait. p. 274. 10.— *Trochilus campestris* Wied Beitr. IV. p. 73. 9 (♀ an ♂ juv.). — *Ornismya amethystoides* Less. Troch. p. 79. t. 25, p. 81. t. 26 & p. 83. t. 27. — *Ornismya orthura* Id. l. l. p. 85. t. 28 & p. 88. t. 29 (♂ juv.). — *Trochilus orthurus* Jard. Humm. B. II. p. 60. t. 8 (♂ juv.). — *Trochilus amethystoides* Id. l. l. II. p. 62. — *Cynanthus amethystinus, amethystoides & orthurus* Id. l. l. II. p. 143. 3-5. — *Mellisuga amethystina* Steph. Gen. Z. XIV. p. 243. — Gray Gen. B. I. p. 113. 72. — *Mellisuga amethystoides* Id. l. l. I. p. 113. 73. — *Tryphaena amethystina* Gould Mon. Troch. I. in text. ad tab. 14. — Bp. Consp. I. p. 84. gen. 199. 2. — *Calliphlox amethystoides* Id. l. l. I. p. 84. gen. 199. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 359. —

Brasilien — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., 2 ♀ — 6 St.

Gen. THAUMASTURA *) Bp. 1849. —

Phaetornis Tsch. 1844 (nec Sws. 1827). *Cora* Bp. 1854.

130. 1. T. Corae Bp.

Consp. I. p. 85. gen. 203. 1. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 2. — *Ornismya Cora* Less. & Garn. Voy. Coqu. Ois.

*) Zwischen dieser und der vorhergehenden Gattung steht gleichsam als Bindeglied das Genus:

Tilmatura Rchb. 1854 (*Tryphaena* Gould 1849, nec Ochsenheimer 1816. *Thaumastura pt.* Bp. 1854),

mit der einzigen bis jetzt bekannten Art:

t. 13. 4. — Less. Man. Orn. II. p. 82. — Id. Ois. Mouch. p. 52. t. 6. — Id. Troch. p. 109. t. 39 & p. 111. t. 40. — Id. Trait. p. 276. 20.—*Trochilus Cora* Jard. Humm. B. I. p. 129. t. 25.—Id. l. l. II. p. 137. 6.— *Trochilus (Phaetornis) Cora* Tsch. Consp. p. 37. 204.—Id. Faun. Per. p. 245. 7.—
Peru — ♂ — 2 St.

Gen. Myrtis Rchb. 1854. —

Doricha Rchb. 1854. *Elisa* Bp. 1854.

131. 1. M. enicura Nob.

Trochilus enicurus Vieill. N. D. XXII. p. 429. — Id. Enc. p. 560. 45. — Temm. Pl. col. 66. 3. — Less. Man. Orn. II. p. 77. — Jard. Humm. B. I. p. 145. t. 27. — Diezmann Colibr. p. 138. t. 27. — *Ornismya heteropygia* Less. Ois. Mouch. p. 72. t. 15 (♂).— *Trochilus Swainsoni* Id. Troch. p. 167. t. 66 (♀). — *Cynanthus enicurus* Jard. Humm. B. II. p. 145. 10. — *Calothorax enicurus* Gray Gen. B. I. p. 110. 5. — Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 7. — *Thaumastura enicura* Gould Mon. Troch. IV. t. 1. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 191. — *Doricha henicura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Lucifer enicurus* Bp. Consp. Troch. p. 11. gen. 73. 294. — *Calliphlox henicura* Rchb. Troch. Enum. p. 10. —
Guatimala — ♂ — 1 St.

132. 2. M. Fanny Rchb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornismya Fanny* Less. Ann. Sci. Nat. 1838. p. 170. — Id. R. Z. 1838. p. 314. — *Trochilus Labrador* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1839. p. 389. t. 8. — Id. & Delattr. R. Z. 1846. p. 311. — *Calothorax Fanny* Gray Gen. B. I. p. 110. 14. — Gould Mon. Troch. XII. t. 6. — *Thaumastura Fanny* Bp. Consp.

T. Duponti. — *Ornismya Duponti* Less. Ois. Mouch. Suppl. p. 100. t. 1. — *Ornismya caelestis* Id. Trait. p. 276. 21. — *Trochilus Duponti* Jard. Humm. B. I. p. 131. t. 26. — Diezmann Colibr. p. 136. t. 26. — *Cynanthus Duponti* Jard. Humm. B. II. p. 145. 11. — *Ornismya zemès* Less. R. Z. 1838. p. 315. — *Mellisuga Duponti* Gray Gen. B. I. p. 113. 71. — *Tryphaena Duponti* Gould Mon. Troch. I. t. 14. — Bp. Consp. I. p. 84. gen. 199. 1. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 194. — *Trochilus lepidus* Licht. in Mus. Berol. — *Tilmatura lepida* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 711. 4610-14. — *Thaumastura Duponti* Bp. Consp. Troch. p. 11. gen. 74. 296 (Mexico und Guatimala). —

I. p. 85. gen. 203. 3.—*Lucifer Labrador* Id. Consp. Troch. p. 11. gen. 73. 292. — Rchb. Troch. Enum. p. 10. —
Peru — ♂ — 1 St.

Gen. Chaetocercus Gray 1855. —

Calothorax Gould 1851 & Rchb. 1854 (nec Gray 1840). *Callothorax* Bp. 1854.

133. 1. C. Heliodori Nob.

Ornismya Heliodori Bourc. R. Z. 1840. p. 275. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 308. t. 15-16.— *Mellisuga Heliodori* Gray Gen. B. I. p. 113. 66. — *Calothorax Heliodori* Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 5.— Gould Mon. Troch. II. t. 8. — Scl. B. Bogot. p. 13. 110.— *Callothorax Heliodorus* Bp. Consp. Troch. p. 12. gen. 76. 308.— *Lucifer Heliodori* Rchb. Troch. Enum. p. 10. —
Peru — ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv.; Neu-Granada — ♂ ad. — 4 St.

134. 2. C. Mulsanti Nob.

Ornismya Mulsanti Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 342. t. 20. — *Mellisuga Mulsanti* Gray Gen. B. I. p. 113. 65. — *Calothorax Mulsanti* Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 4. — Gould Mon. Troch. II. t. 9. — Scl. B. Bogot. p. 13. 111. — *Lucifer Mulsanti* Rchb. Troch. Enum. p. 10. — *Trochilus filicaudus* Licht. in Mus. Berol. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

135. 3. C. Rosae Nob.

Trochilus Rosae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 316. — *Mellisuga Rosae* Gray Gen. B. I. p. 113. 64. — *Calothorax Jourdani* pt. Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 6. — *Calothorax Rosae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 3. — *Lucifer Rosae* Rchb. Troch. Enum. p. 10. — *Trochilus Tourdeaui* „Bourc." in Mus. Berol. —
Caracas — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Subfam. ORTHORHYNCHINÆ. Elfen.

Gen. ORTHORHYNCHUS *) Cuv. 1799-1800. —

136. 1. O. cristatus „Cuv."

Gray List Gen. B. p. 19. — Bp. Consp. I. p. 83. gen. 195. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 807. 4876-77. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 9. — *Trochilus cristatus* Lin. S. N. p. 192. 18. — Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 56. — Vieill. Enc. p. 565. 65. — Jard. Humm. B. II. p. 139. 15. — Sws. B. Braz. t. 21. — *Oiseau - mouche huppé de Cayenne* Buff. Pl. enl. 227. 1. — *Trochilus puniceus* (!) Gm. S. N. p. 497. 59. — *Trochilus pileatus* Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 57. — *Oiseau-mouche à huppe bleue* Vieill. Ois. dor. I. p. 112. t. 63. — *Ornismya cristata* Less. Troch. p. 20. t. 4. — *Mellisuga cristata* Gray Gen. B. I. p. 113. 98. —

Barbadoes — ♂ — 1 St.

Gen. CEPHALOLEPIS **) Lodd. 1831. —

Cephallepis (!) Lodd. 1831. *Smaragditis* Rchb. 1849 (nec Boie 1831). *Cephalepis* (!) Bp. 1849. *Orthorhynchus* Burm. 1856 (nec Cuv. 1799-1800).

137. 1. C. Delalandi Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 3. — *Trochilus Delalandi* Vieill. N. D. XXIII. p. 427. — Id. Enc. p. 558. 41. — Temm. Pl. col. 18. 1-2. — Less. Man.

---

*) Die zweite Art dieser eigenthümlich westindischen Gattung ist:
O. exilis Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 807. 4879.— Gould Mon. Troch. XIII. t. 10. — Newton Ibis 1859. p. 141. 9. — *Trochilus exilis* Gm. S. N. p. 484. 24. — Lath. Ind. Orn. I. p. 310. 32. — Vieill. Enc. p. 550. 7. — *Trochilus cristatellus* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. XXXIX. — Vieill. N. D. VII. p. 352. — Id. Enc. p. 556. 33. — *Oiseau - mouche huppé* Vieill. Ois. dor. I. p. 91. t. 47 & p. 92. t. 48. — *Ornismya cristata* Less. Ois. Mouch. p. 113. t. 31-32 (nec Troch. p. 20. t. 4). — Id. Trait. p. 285. 56.— *Mellisuga exilis* Gray Gen. B. I. p. 113. 98. — *Orthorhynchus chlorolophus* Bp. Consp. I. p. 83. gen. 195. 2 (Martinique, Nevis und St. Croix). —

**) Auch von dieser ausgezeichneten Gattung kennt man nur noch eine sehr seltene Art: *C. Loddigesi* Bp. Consp. I. p. 83. gen. 196. 2. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 4. — *Trochilus Loddigesi* Id. P. Z. S. 1830. p. 12. — Less. Troch. p. 138.

Orn. II. p. 76. —Jard. Humm. B. I. p. 101. t. 10 (♂) & II. p. 59. t. 7 (♀).—Id. l. l. II. p. 138. 11.—Sws. B. Braz. t. 22.—Diezmann Colibr. p. 106. t. 10 (♂).— *Trochilus versicolor* Vieill. N. D. XXIII. p. 430. — Id. Enc. p. 560. 47 (♂ juv.). — *Ornismya Delalandi* Less. Ois. Mouch. p. 95. t. 23-24. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 136. t. 19. — Id. Trait. p. 285. 55. — Id. Troch. p. 113. t. 41. — *Mellisuga Delalandi* Gray Gen. B. I. p. 114. 99. — *Cephalepis Lalandi* Bp. Consp. I. p. 83. gen. 196. 1. — *Orthorhynchus Delalandi* Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 808. 4880-83. — Burm. Th. Bras. II. p. 351. 1. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. Lophornis Less. 1829. —

Bellatrix Boie 1831. *Lophornis* & *Bellatrix* Rchb. 1854. *Lophorinus* (!) Bp. 1854.

138. 1. L. magnifica Bp.

Consp. I. p. 83. gen. 197. 2. — Gould Mon. Troch. X. t. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 335. 1. — *Trochilus magnificus* Vieill. N. D. VII. p. 367 & XXIII. p. 428. — Id. Enc. p. 559. 42. — Temm. Pl. col. 229. — Less. Man. Orn. II. p. 80. — Wied Beitr. IV. p. 79. — Jard. Humm. B. I. p. 119. t. 19 & p. 121. t. 20 (♂ juv. & ♀). — Id. l. l. II. p. 140. 21. — Diezmannn Colibr. p. 124. t. 19 & p. 126. t. 20 (♂ juv. & ♀). — *Trochilus decorus* Licht. Doubl. p. 14. 120. — *Colibri helios* Spix Av. Bras. I. p. 81. 5. t. 82. 2. — *Ornismya strumaria* Less. Ois. Mouch. p. 143. t. 42-43. — Id. Trait. p. 285. 58. — *Lophornis strumaria* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. XVI.— *Mellisuga magnifica* Gray Gen. B. I. p. 113. 88. — *Bellatrix magnifica* Rchb. Aufz. Colibr. 12. — Id. Troch. Enum. p. 91. t. 813. 4897-900. —

Brasilien — 3 ♂ ad., ♂ juv. — 4 St.

139. 2. L. ornata Less.

Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. XVI. — Id. Trait. p. 285. 57. — Gray List. Gen. B. p. 19. — Rchb. Troch.

---

t. 51.— Jard. Humm. B. I. p. 57. t. 6 & p. 138. 12. — *Trochilus opisthocomus* „Licht." Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 6. 45. t. 2. 3. — *Mellisuga Loddigesi* Gray Gen. B. I. p. 114. 100.— *Orthorhynchus Loddigesi* Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 809. 4884-87. — Burm. Th. Bras. II. p. 352. 2 (San Paulo). —

Enum. p. 9. t. 811. 4889-91. — Gould Mon. Troch. X. t. 1. — *Oiseau-mouche dit hupe-col de Cayenne* Buff. Pl. enl. 640. 3. — *Trochilus ornatus* Gm. S. N. p. 497. 58. — Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 58. — Vieill. Enc. p. 565. 64. — Jard. Humm. B. I. p. 112. t. 15 & p. 114. t. 16 (♂ & ♀). — Id. l. l. II. p. 139. 7. — Diezmann Colibr. p. 117. t. 15 & p. 119. t. 16 (♂ & ♀). — *Hupe-col* Vieill. Ois. dor. I. p. 94. t. 49-51. — *Ornismya ornata* Less. Ois. Mouch. p. 139. t. 41. — Id. Troch. p. 77. t. 24. — Id. Trait. p. 285. 57. — *Mellisuga ornata* Gray Gen. B. I. p. 113. 84. — *Lophornis auratus* (!) Bp. Consp. I. p. 83. gen. 197. 1. —

Cayenne — 2 ♂ ad., 2 ♂ juv. — 4 St.

Gen. POLEMISTRIA *) Nob. —

Bellatrix Bp. 1854 (nec Boie 1831).

140. 1. P. chalybea Nob.

Trochilus chalybeus Vieill. Enc. p. 574. 91. — Temm. Pl. col. 66. 2. — Less. Man. Orn. II. p. 77. — Jard. Humm. B. I. p. 129. t. 18. — Id. l. l. II. p. 140. 19. — Diezmann Colibr. p. 122. t. 18. — *Trochilus festivus* Licht. Doubl. p. 14. 122. — *Colibri mystax* Spix Av. Bras. I. p. 82. 6. t. 82. 3. — *Ornismya Vieillotii* Less. Ois. Mouch. p. 186. t. 64. — Id. Trait. p. 286. 59. — Id. Troch. p. 37. t. 8, p. 41. t. 9, p. 44. t. 10 & p. 46. t. 11. — *Ornismya Audenetii* Less. Ois. Mouch. Suppl. p. 107. t. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 355. Anm. — *Trochilus Audenetii* Jard. Humm. B. I. p. 127. t. 17. — Id. l. l. II. p. 139. 18. — Diezmann Colibr. p. 120. t. 17. — *Mellisuga Audenetii* Gray Gen. B. I. p. 113. 89. — *Mellisuga chalybea* Id. l. l. I. p. 113. 90. — *Lophornis Audenetii* Bp. Consp. I. p. 84. gen. 197. 6. — *Lophornis chalybea* Id. l. l. I. p. 84. gen. 197. 9. — Gould Mon. Troch. III. t. 13. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 812. 4894-95. — *Bellatrix chalybaea* Bp. Consp. Troch. p. 12. gen. 78. 316. — *Lophornis festivus* Burm. Th. Bras. II. p. 354. 2. —

Peru — ♂ ad. — 1 St.

---

*) Von πολεμίστρια = *bellatrix*. — Die zweite von Bonaparte hierher gezählte Art ist:

P. Verreauxi. — *Trochilus Verreauxii* Bourc. R. & Mag. 1853. p. 193. t. 6. — *Lophornis Verreauxi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 812. 4896. — *Bellatrix Verreauxi* Bp. Consp. Troch. p. 12. gen. 78. 317 (Peru). —

Gen. HELIACTIN Boie 1831. —

Heliactinia Rchb. 1849. *Heliactinus* Burm. 1856.

141. 1. H. cornuta Bp.

Consp. I. p. 85. gen. 202. 1. – Gould Mon. Troch. XI. t. 2. — *Trochilus cornutus* Wied Reis. Bras. II. p. 190. — Id. Beitr. IV. p. 99. 16. — Jard. Humm. B. II. p. 122. t. 21 & p. 124. t. 22 (♂ & ♀). — Id. l. l. II. p. 137. 7. — Diezmann Colibr. p. 127. t. 21 & p. 129. t. 22 (♂ & ♀).— *Trochilus bilophus* Temm. Pl. col. 18. 3. — *Trochilus dilophus* Vieill. Enc. p. 573. 88. — Less. Man. Orn. II. p. 76. — *Ornismya chrysolopha* Id. Ois. Mouch. p. 55. t. 7-8. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 162. t. 32. — Id. Trait. p. 276. 18. — *Mellisuga bilopha* Steph. Gen. Z. XIV. p. 251. t. 30. — *Mellisuga cornuta* Gray Gen. B. I. p. 113. 67. — *Heliactinia chrysolopha* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 814. 4902-4. — *Heliactinus cornutus* Burm. Th. Bras. II. p. 356. — *Trochilus bilobus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — 3 ♂. ♀ — 4 St.

Gen. PRYMNACANTHA *) Nob. —

Gouldia (!) Bp. 1849. *Popelairia* (!) Rchb. 1854. *Gouldomyia* (!) Bp. 1854.

142. 1. P. Popelairei Nob.

Trochilus Popelairei Dubus Esqu. Orn. t. 6. — *Mellisuga Popelairei* Gray Gen. I. p. 113. 70. — *Gouldia Popelairei* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 204. 2. — Gould Mon. Troch. VII. t. 6. — Scl. B. Bogot. p. 13. 108. — *Popelairia tricholopha* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 815. 4905-7. —

Peru — ♂. ♀ — 2 St.

---

*) Von πρύμνα (Hintertheil, Schwanz) und ἄκανθα (Dorn). - Die vierte bis jetzt bekannte Art dieser niedlichen „Dornenschwänzchen" ist:

P. Laetitiae. — *Trochilus Laetitiae* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1852. p. 143. — *Gouldia Laetitiae* Rhhb. Aufz. Colibr. p. 12. — Gould Mon. Troch. X. t. 12 (Bolivien). —

143. 2. P. Conversi Nob.

Trochilus Conversi Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1840. p. 313. — Iid. R. Z. 1840. p. 314. t. 3.— *Mellisuga Conversii* Gray Gen. B. I. p. 113. 69.— *Gouldia Conversi* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 204. 3. — Gould Mon. Troch. VII. t. 7. — Scl. B. Bogot. p. 13. 109. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 817. 4911-14. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

144. 3. P. Langsdorffi Nob.

Trochilus Langsdorffii Vieill. Enc. p. 574. 92. — Temm. Pl. col. 66. 1.— Less. Man.Orn. II. p. 77.— Jard. Humm. B. II. p. 69. t. 10. — *Colibri hirundinaceus* Spix Av. Bras. I. p. 80. 2. t. 81. 2. — *Orthorhynchus Langsdorffii* Less. Man. Orn. II. p. 77.— *Ornismya Langsdorffii* Id. Ois. Mouch. p. 102. t. 26.— Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 129. t. 16. — Id. Trait. p. 276. 19. — Id. Troch. p. 101. t. 35. — *Cynanthus Langsdorffii* Jard. Humm. B. II. p. 146. 15. — *Mellisuga Langsdorffii* Gray Gen. B. I. p. 113. 68. — *Gouldia Langsdorffi* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 204. 1. — Gould Mon. Troch. VII. t. 5. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 816. 4908-10. — Burm. Th. Bras. II. p. 357. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. DISCURA Rchb. (& Bp.) 1854. —

Platurus Less. 1829 (nec Latr.). *Ocreatus* (!) *pt.* Gould *Discosura* (!) Bp. 1849.

145. 1. D. longicauda Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 706. 4591-93. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 3. — *Trochilus longicaudus* Gm. S. N. p. 498. 60. — *Trochilus platurus* Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 55. — Vieill. N. D. VII. p. 320. — Id. Enc. p. 569. 77. — Jard. Humm. B. II. p. 111. — Wied Beitr. IV. p. 96. 15. — *Oiseau-mouche à raquettes* Vieill. Ois. dor. I. p. 98. t. 52. — *Ornismya platura* Less. Ois. Mouch. p. 136. t. 40. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 31. — Id. Trait. p. 277. 23. — *Cynanthus platurus* Jard. Humm. B. II. p. 144. 9. — *Mellisuga platura* Steph. Gen. Z. XIV. p. 242. — *Trochilus (Platurus) platurus* Tsch. Consp. p. 37. 203. — Id. Faun. Per. p. 245.

6. — *Trochilus (Ocreatus) ligonicaudus* Gould P. Z. S. 1846. p. 86. — *Mellisuga longicauda* Gray Gen. B. I. p. 113. 55.— *Mellisuga ligonicauda* Id. l. l. I. p. 113. 57. — *Discosura longicauda* Bp. Consp. I. p. 84. gen. 198. 1. — *Discosura ligonicauda* Id. l. l. I. p. 84. gen. 198. 2. — *Discura platura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 706. 4594-95.— *Platurus longicaudus* Burm. Th. Bras. II. p. 358. — *Platurus platurus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂ ad., 2 ♂ juv. — 3 St.

Gen. Steganurus *) Rchb. 1849. —

Ocreatus (!) *pt.* Gould 1846. *Spathura* Id. 1850. *Steganura* Rchb. 1854.

146. 1. S. Underwoodi Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 707. 4596-97. — *Ornismya Underwoodii* Less. Troch. p. 105. t. 37 (♂). — *Ornismya Kieneri* Id. l. l. t. 65 (♀). — *Trochilus Underwoodii* Jard. Humm. B. II. p. 110. t. 22 (♂). — *Cynanthus Underwoodii* Id. l. l. II. p. 144. 10 (♂). — *Cynanthus Kieneri* Id. l. l. II. p. 146. 16 (♀). — *Mellisuga Underwoodi* Gray Gen. B. I. p. 113. 56. — *Spathura Underwoodi* Gould Mon. Troch. I. t. 9. — Bp. Consp. I. p. 80. gen. 185. 1. — Scl. B. Bogot. p. 13. 107. — *Steganura spatuligera* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8 & p. 24. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 708. 4598-600. — *Trochilus ventilabrum* Lath. MSS. —

Neu-Granada **) — 2 ♂, 2 ♀; Merida **) — ♂ — 5 St.

---

*) Man kennt bis jetzt noch folgende Arten dieser Gattung:

3. *S. melananthérus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 710. 4608-9. — *Spathura melananthera* Jard. Contrib. Orn. 1851. p. 111. t. 80.— Gould Mon. Troch. XVIII. t. 5.— *Discura melananthera* Bp. Consp. Troch. p. 11. gen. 70. 282 (Ecuador);
4. *S. cissiurus.* — *Spathura cissiura* Gould P. Z. S. 1853. p. 109. 1 (Peru);
5. *S. peruanus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 709. 4606-7. — *Spathura peruana* Gould P. Z. S. 1849. p. . . — Id. Mon. Troch. I. t. 10. — Bp. Consp. I. p. 80. gen. 185. 2 (Peru);
6. *S. Addae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 709. 4603-5. — *Trochilus Addae* Bourc. R. Z. (Sept.) 1846. p. 312. — *Trochilus (Ocreatus) rufocaligatus* Gould P. Z. S. (Oct.) 1846. p. 86. — *Mellisuga rufocaligata* Gray Gen. B. I. p. 113. 59. — *Spathura rufocaligata* Gould Mon. Troch. I. t. 11. — *Spathura Addae* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 185. 3 (Bolivien). —

**) Die bogotensischen Exemplare sind kleiner und bedeutend kurzschwänziger als

147. 2. S. remigera Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8 & p. 24. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 708. 4601-2. —

Long. tot. 5″ 3‴, al. 1″ 8‴, rectric. ext. 3″ 3‴. —

Nord-Peru — ♂ — 1 St.

Subfam. LESBIINÆ. Sylphen.

Gen. OXYPOGON Gould 1848. —

148. 1. O. Guerini *) Gould

Mon. Troch. I. t. 12. — Bp. Consp. I. p. 79. gen. 183. 1. — Scl. B. Bogot. p. 12. 97. — *Ornismya Guerinii* Boiss. R. Z. 1840. p. 7. — Lodd. P. Z. S. 1843. p. 122. — *Trochilus parvirostris* Fras. l. l. 1840. p. 18 (♂ jun.). — *Mellisuga Guerinii* Gray Gen. B. I. p. 112. 30. — *Trochilus Guerinii* Gould P. Z. S. 1848. p. 14. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. CHALCOSTIGMA Rchb. (Mart.) 1854. —

Lampropogon Bp. (Mai.) 1854.

149. 1. C. heteropogon Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — *Ornismya heteropogon* Boiss. R. Z. 1839. p. 355. — Id. Mag. Z. 1840. t. 12. — *Trochilus coruscus* Fras. P. Z. S. 1840. p. 15. — *Mellisuga heteropogon* Gray Gen. B. I. p. 112. 28. — *Rhamphomicron heteropogon* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 2. — Gould Mon. Troch. IV. t. 6. — Scl. B. Bogot. p. 12. 96. — *Lampropogon heteropogon* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 37. 142. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

---

das von Merida, und geben wir desshalb hier, um auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen, die Maasse zweier Exemplare:

von Merida: G. L. 5″ 6‴, Fl. 1″ 9‴, äusserste Schwz.-Feder 3″ 6‴;
„ Bogota: „ „ 4″ 3‴, „ 1″ 6‴, „ „ „ 2″ 9‴. —

*) Sehr ähnlich ist die zweite Art dieser Gattung:

O. Lindeni Gould Mon. Troch. I. t. 13. — Bp. Consp. I. p. 79. gen. 183. 2. — *Ornismya Lindenii* Parzud. R. Z. 1845. p. 253. — *Mellisuga Lindenii* Gray Gen. B. I. p. 113. 31. — *Trochilus Lindenii* Gould P. Z. S. 1848. p. 14 (Merida). —

Gen. UROLAMPRA *) Nob. —

Metallura Bp. 1854 (nec Gould 1847).

150. 1. U. tyrianthina Nob.

Trochilus tyrianthinus Lodd. P. Z. S. 1832. p. 6. — *Ornismya Allardi* Bourc. R. Z. 1839. p. 294. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1840. p. 226. t. 3-4. — *Ornismya Paulinae* Boiss. R. Z. 1839. p. 354. — Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 13. — *Mellisuga tyrianthina* Gray Gen. B. I. p. 112. 36.— *Trochilus Allardi* Jard. Contrib. Orn. 1850. p. 81-89 & p. 151. t. 55. — *Metallura tyrianthina* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 4. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 719. 4630-31. — Scl. B. Bogot. p. 12. 98. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 3. —

Neu-Granada — 3 ♂; Peru — ♂, ♀ — 5 St.

151. 2. U. aeneicauda Nob.

Trochilus aeneicaudus Gould P. S. Z. 1846. p. 87. — *Mellisuga aeneicauda* Gray Gen. B. I. p. 113. 44. — *Metallura aeneicauda* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 2. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 720. 4634-35. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 2. — *Aglaeactis aeneicauda* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 38. 150. —

Peru — ♀ — 1 St.

152. 3. U. chloropogon nov. sp.

Mas: Purpureo - fuscescens nitore quodam metallico virescenti, vertice humeris uropypioque valde, imprimis autem macula gulari splendidissime virescente - fulgentibus; alis purpureo-fuscis, rectricibus latissimis pulchre purpureo - resplendentibus; crisso albido, tectricibus caudae inferioribus virescenti - nitentibus margine lutescenti.

---

*) Von οὐρα (Schwanz) und λαμπρός (glänzend). — Ausser den drei oben aufgezählten Arten möchten wir noch hierher rechnen:

4. *U. smaragdinicollis.* — *Orthorhynchus smaragdinicollis* Orb. & Lafr. Syn. p. 31. 23. — Orb. Voy. p. 375. 318. t. 59. 2. — *Mellisuga smaragdinicollis* Gray Gen. B. I. p. 112. 42. — *Metallura smaragdinicollis* Bp. Consp. I. p. 75. 173. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 719. 4632 & t. 720. 4633. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 4 (Peru und Bolivien);

5. *U. primolina.* — *Metallura primolina* Bourc. R. & Mag. Z. 1853. p. 295 (Rio Napo);

6. *U. Williami.* — *Trochilus Williami* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 308. — *Mellisuga Williami* Gray Gen. B. I. p. 112. 38. — *Metallura Wililami* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 5. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 803. 4870. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 5 (Neu-Granada). —

Fem. (an mas juv.): Subtus brunnescenti-ochracea gula lateribusque maculis parvis fuscis virescentibusque guttatis, rectricibus splendide purpurascentibus, tribus externis apice pallide albescentibus. — Long. tot. 3" 6"', al. 2", caud. 1" 6"', rostr. culm. 5"'. —

? — ♂, ♀ (an ♂ juv.) — 2 St.

Gen. Metallura Gould 1847. —

153. 1. **M. opaca Nob.**

Trochilus (Lampornis) opacus „Licht." Tsch. Consp. p. 38. 210. — Id. Faun. Per. p. 248. 13. — *Trochilus cupreicaudus* Gould P. Z. S. 1846. p. 87. — *Mellisuga cupreicauda* Gray Gen. B. I. p. 113. 43. — *Metallura cupreicauda* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 721. 4638-39. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 1. — *Aglaeactis cupreicauda* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 38. 151. —

Peru — ♂ — 1 St.

Gen. Aglaïactis *) Gould 1848. —

Aglaeactis (!) Gould 1848.

154. 1. **A. Pamelae Bp.**

Consp. I. p. 73. gen. 167. 2. — Gould Mon. Troch. XII. t. 2. — *Orthorhynchus Pamela* Orb. & Lafr. Syn. p. 29. 14. — Orb. Voy. p. 375. 319. t. 60. 1. — *Hylocharis Pamela* Gray Gen. B. I. p. 114. 13. — *Helianthea Pamela* Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 738. 4691-92. —

Bolivien — ♂, ♀ — 2 St.

155. 2. **A. cupripennis Bp.**

Consp. I. p. 73. gen. 167. 1. — Gould Mon. Troch. XII. t. 1. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 18. — *Trochilus cupripennis* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 46. — Id. R. Z. 1843. p. 71. — *Mellisuga cupri-*

*) Ausserdem gehören noch zu dieser Gattung:
3. *A. Castelnaui* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 167. 4. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 8. — *Trochilus Castelnaudii* (!) Bourc. R. Z. 1848. p. 270. — *Trochilus Castelnauii* Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Aglaeactis Castelnaudi*

pennis Gray Gen. B. I. p. 112. 25. — *Helianthea cupripennis* Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 737. 4689-90. — Long. tot. 4" 3"', al. 2" 10"', caud. 1" 7"', rostr. culm. $7^1/_2$"'. —

Neu-Granada — ♂ — 3 St.

Gen. Rhamphomicrus Bp. 1849. —

Rhamphomicron (!) Bp. 1849.

156. 1. **R. microrhynchus Bp.**

Consp. I. p. 79. gen. 182. 1. — Gould Mon. Troch. VI. t. 4. — Rchb. Troch. Enum. p. 10. t. 818. 4915-18. — Scl. B. Bogot. p. 12. 95. — *Ornismya microrhyncha* Boiss. R. Z. 1839. p. 354.—Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 16.— *Trochilus brachyrhynchus* Fras. P. Z. S. 1840. p. 16.— *Mellisuga microrhyncha* Gray Gen. B. I. p. 112. 32. — *Trochilus euanthes* Licht. in Mus. Berol. —

Neu-Granada — 2 ♂ ad., ♂ jun. — 3 St.

Gen. Agaclyta *) Nob. —

Lesbia Gould 1856 (nec Less. 1832).

157. 1. **A. Gouldi Nob.**

Trochilus Gouldii Lodd. P. Z. S. 1832. p. 7. — *Ornismya silphia* (!) Less. R. Z. 1840. p. 73.—*Mellisuga Gouldii* Gray Gen. B. I. p. 113. 51. — *Cynanthus Gouldi* Bp.

(!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 9.—*Helianthea Castelnaudi* (!) Id. l. l. Troch. Enum p. 6. t. 738. 4693-94 (Peru);

4. *A. caumatonota* Gould P. Z. S. 1848. p. 12. — Bp. Consp. I. p. 73. gen. 167. 3. — *Trochilus caumatonotus* Gray Gen. B. III. App. 30a. — *Helianthea caumatonota* Rchb. Troch. Enum. p. 6 (Peru);

5. *A. aequatorialis* nov. sp. — Südlicher Repräsentant von *A. cupripennis*, aber weit grösser und langflügliger, mit längerm an der Wurzel schmälern Schnabel und weniger rein röthlicher Unterseite, wo besonders die Kehle einen etwas schwärzlichen Anflug zeigt; auch ist der Schwanz etwas länger und zeigt breitere glänzendere Ränder. — G. L. 5", Fl. 3" 3"', Schw. 2", Schnabelf. 9"'. — Mehrere Exemplare vom Chimborazo aus Ecuador im münchener Museum. —

*) Von ἀγακλυτός (= *inclytus*). — Dem Schnabel nach noch zu *Ramphomicrus* zu zählen, dem Schwanze nach schon zu *Lesbia* und so zwischen diesen beiden Gattungen gleichsam den Uebergang vermittelnd. Es gehört hierher nur noch die dem oben aufgeführten Typus *A. Gouldi* sehr nahe verwandte:

Consp. I. p. 81. gen. 187. 4. — *Lesbia Gouldi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 712. 4615-17. — Scl. B. Bogot. p. 12. 94. — Gould Mon. Troch. XII. t. 8.—
Neu-Granada — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. Lesbia Less. 1832. —

Cynanthus (!) Sws. 1837 (nec 1827) & Gould 1852. *Cyananthus* Rchb. 1854.

158. 1. L. mocoa Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 717. 4626-27. — *Trochilus mocoa* Delattr. & Bourc. R. Z. (Sept.) 1846. p. 311. — *Trochilus (Lesbia) smaragdinus* Gould P. Z. S. (Oct.) 1846. p. 85. — *Mellisuga smaragdinis* (!) Gray Gen. B. I. p. 113. 52. — *Cynanthus mocoa* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 3. — *Cynanthus smaragdinicaudus* Gould Mon. T och. III. t. 3. —
Bolivien — ♂ — 1 St.

159. 2. L. Gorgo Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8 & p. 24. — Id. Troch. Enum. p. 5. — *Ornismya Kingii* Boiss. (nec Less.) R. Z. 1840. p. 7. — *Lesbia cyanura* Scl. (nec Steph.) B. Bogot. p. 12. 92. —
Columbien — 3 ♂ ad., ♀ jun. — 5 St.

160. 3. L. forficata Gray

List Gen. B. p. 18. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 718. 4628-29. — *Trochilus forficatus* Lin. S. N. p. 190. 5. — Lath. Ind. Orn. I. p. 303. 7. — Vieill. Enc. p. 559. 44. — *Oiseau-mouche à tête bleue* Id. Ois. dor. I. p. 108. t. 60.— *Cynanthus forficatus* Sws. Class. B. II. p. 330. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 1. — *Trochilus cyanurus* Steph. Gen. Z. XIV. p. 239. — *Ornismya Kingii* Less. Troch. p. 107. t. 38. — *Mellisuga forficata* Gray Gen. B. I. p, 113. 49. — *Mellisuga cyanura* Id. l. l. I. p. 113. 50. — *Cynanthus cyanurus* Gould Mon. Troch. III. t. 2. — *Trochilus bipartitus* Lath. MSS. —
Peru — ♂ — 1 St.

A. *gracilis.* — *Trochilus (Lesbia) gracilis* Gould P. Z. S. 1846. p. 88. — *Mellisuga gracilis* Gray Gen. B. I. p. 113. 53. — *Cynanthus gracilis* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 5. — *Lesbia gracilis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 713. 4618-19 (Peru). —

Gen. ADELISCA *) Nob. —

Adelomyia (!) Bp. 1854.

161. 1. **A. melanogenys** Nob.

Trochilus melanogenys Fras. P. Z. S. 1840. p. 15. — *Trochilus Sabinae* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 323. — Iid. R. Z. 1846. p. 316. 12. — *Mellisuga Sabinae* Gray Gen. B. I. p. 112. 33. — *Mellisuga melanogenys* Id. l. l. I. p. 112. 35. — *Rhamphomicron Sabinae* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 5. — *Rhamphomicron melanogenys* Id. l. l. I. p. 79. gen 182. 7. — *Metallura Sabinae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 720. 4636-37. — *Adelomyia Sabinae* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 44. 162. — *Adelomyia melanogenys* Scl. B. Bogot. p. 12. 99. — Gould Mon. Troch. IX. t. 13. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. BAUCIS Rchb. 1844. —

Abeillia (!) Bp. 1849. *Myiabeillia* (!) Id. 1854.

162. 1. **B. Abeillei** Rchb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornismya Abeilleii* Delattr. & Less. R. Z. 1839. p. 16. — *Mellisuga Abeillei* Gray Gen. B. I. p. 112. 37. — *Rhamphomicron Abeillii s. Abeillia typica* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 4. — *Myiabeillia typica*

*) Nach Reichenbach's vortrefflichem Grundsatze „*Nomina generica in*" — *myia i. e. musca*" *desinentia pertinent insectis dipteris, quorum permulta iam iis insignita sunt*" (Troch. Enum. p. 12. Adn.) verwerfen wir wie oben *Doleromyia* (!) so jetzt *Adelomyia* (!) und setzen an dessen Stelle das Diminutivum von ἄδηλος *(obscurus, plebeius)*. — Die einzige uns noch bekannte Art dieser Gattung ist:

A. inornata. — *Trochilus inornatus* Gould P. Z. S. 1846. p. 89. — *Mellisuga inornata* Gray Gen. B. I. p. 112. 34. — *Rhamphomicron inornatus* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 6. — *Metallura inornata* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. — *Adelomyia inornata* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 44. 163. — Gould Mon. Troch. XI. t. 15 (Bolivien). —

Dagegen ist der von Bonaparte ganz ohne Bedenken von Gould schon mit weniger Entschiedenheit zu *Adelomyia* (!) gezogene *Trochilus floriceps* Gould als eigene Gattung *Anthocephala* (von ἄνθος, Blume, und κεφαλή, Kopf) aufzuführen:

A. floriceps. — *Trochilus floriceps* Gould P. Z. S. 1853. p. 62. — Id. Athen. 1853. p. 481. — *Metallura floriceps* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. — *Adelomyia floriceps* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 44. 164. — Gould Mon. Troch. IX. t. 14 (Santa Martha). —

Id. Consp. Troch. p. 7. gen. 41. 157. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 7. — Scl. Ibis 1859. p. 128. 186. — *Basilinna Abeillii* Rchb. Troch. Enum. p. 11. —
Guatimala — ♂ — 1 St.

Gen. ERIOCNEMIS Rchb. 1849. —

Eriopus Gould 1847 (nec Treitschke 1825). *Eriopus* Bl. 1849. *Engyete, Threptria* & *Phemonoë* Rchb. 1854. *Eriocnemys* (!), *Aline* (!), *Mosqueria* (!), *Luciania* (!) & *Derbomiya* (!) Bp. 1854. *Luciana* (!) & *Derbyomyia* (!) Gray 1855.

163. 1. E. Alinae Bp.

Consp. Troch. p. 6. gen. 33. 128. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 726. 4655-56. — Scl. B. Bogot. p. 12. 90. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 7. — *Ornismya Aline* (!) Bourc. R. Z. 1842. p. 373. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 344. t. 19. — *Hylocharis Aline* Gray Gen. B. I. p. 114. 6. — *Eriopus Aline* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 186. 6. — *Engyete Aline* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Trochilus dasypus* Licht. in Mus. Berol. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

164. 2. E. cupreiventris Gould

Mon. Troch. VI. t. 9. — Rchb. Troch. Enum p. 6. t. 729. 4668-69. — Scl. B. Bogot. p. 12. 86. — *Ornismya vestita fem.* Longuem. R. Z. 1838. p. 314. — *Trochilus cupreiventris* Fraser P. Z. S. 1840. p. 15. — *Eriopus cupreiventris* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 186. 3. — *Phemonoë cupreiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Ornismya maniculata* Less. MSS. —
Neu-Granada — ♂ — 4 St.

165. 3. E. vestita Rchb.

Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 6. t. 726. 4657-59. — Scl. B. Bogot. p. 12. 87. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 6. — *Ornismya vestita* Longuem. R. Z. 1838. p. 314. — Delattr. & Bourc. l. l. 1839. p. 18. — Iid. l. l. 1840. p. 8. 15. — *Trochilus uropygialis* Fraser P. Z. S. 1840. p. 15. — *Ornismya glomata* Less. Echo Mond. Sav. 184? p. . . . — *Hylocharis vestita* Gray Gen. B. I. p. 114. 2. — *Eriopus vestita* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 186. 1. —
Neu-Granada — 3 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv. — 5 St.

Gen. PANOPLITES *) Gould 1854. —

Boissoneaua (!) Rchb. 1854.

166. 1. P. flavescens Gould

Mon. Troch. VIII. t. 10. — Scl. B. Bogot. p. 13. 101. — *Trochilus flavescens* Lodd. P. Z. S. 1832. p. 7. — *Ornismya paradisea* Boiss. R. Z. 1840. p. 6. — *Mellisuga flavescens* Gray Gen. B. I. p. 112. 26. — *Amazilius flavescens* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 9. — *Boissoneaua flavescens* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 787. 4830-31. — *Clytolaema flavescens* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 47. 175. — *Trochilus Lichtensteinii* Saucerotte in Mus. Berol. —

Peru — ♂ — 2 St.

Gen. HELIOTRYPHON **) Gould 1853. —

Heliotrypha (!) Gould 1853. *Parzudakia* (!) Rchb. 1854. *Heliotryppha* (!) Bp. 1854.

167. 1. H. viola Gould

Mon. Troch. V. t. 1. — *Heliangelus viola* Id. P. Z. S. 1853. p. 61. 3. — *Parzudakia viola* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Rhamphomicron viola* Id. Troch. Enum. p. 10. —

Peru — ♂ — 2 St.

168. 2. H. Parzudakii Gould

Mon. Troch. V. in text. ad tab. 1. — Scl. B. Bogot. p. 12. 85. — *Ornismya Parzudakii* Less. R. Z. 1840. p. 72. — *Mellisuga Parzudakii* Gray Gen. B. I. p. 112. 18. — *He-*

---

*) Ausserdem werden noch von Gould zu dieser Gattung gerechnet:

2. *P. Matthewsi* Gould Mon. Troch. VIII. t. 9. — *Trochilus Matthewsii* „Lodd." Bourc. P. Z. S. 1847. p. 43. — Id. R. Z. 1847. p. 255. — *Mellisuga Matthewsi* Gray Gen. B. I. p. 112. 27. — *Heliodoxa Matthewsi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Clytolaema Matthewsi* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 47. 174. — *Boissoneaua Matthewsi* Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 788. 4832-33 (Peru);

3. *P. Jardinei* Gould Mon. Troch. VIII. t. 8. — *Trochilus Jardini* Bourc. Compt. Rend. 1851. p. 187. — *Florisuga Jardinii* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. — Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 45. 167 (Ecuador). —

**) Wir sahen uns genöthigt *Heliotrypha* (!) Gould in der obigen Weise zu ändern, da wir keine andere Ableitung als die von ἥλιος (Sonne) und τρυφάω (schwelgen) zu finden im Stande waren, und die davon zu bildende Femininal-Endung *Heliotryphosa* als sechssylbig leider unbrauchbar ist. —

liangelus Parzudakii Bp. Consp. I. p. 76. gen. 176. 4. — *Parzudakia dispar* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Rhamphomicron dispar* Id. Troch. Enum. p. 10. — *Trochilus lasiopygus* Licht. in Mus. Berol. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. Heliangelus Gould 1848. —

Anactoria & Diotima Rchb. 1854.

169. 1. H. Clarissae Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 176. 1. — Gould Mon. Troch. IX. t. 1. — Scl. B. Bogot. p. 12. 84. — *Ornismya Clarisse* (!) Longuem. R. Z. 1841. p. 306. — Less. Mag. Z. 1842. Ois. t. 26. — *Mellisuga Clarissae* Gray Gen. B. I. p. 112. 17. — *Anactoria Clarissae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Trochilus Clarissae* Id. Troch. Enum. p. 10. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

170. 2. H. amethysticollis Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 176. 6. — Gould Mon. Troch. IX. t. 3. — *Orthorhynchus amethysticollis* Orb. & Lafr. Syn. p. 31. 24. — Orb. Voy. p. 376. 320. t. 60. 2. — *Trochilus (Lampornis) amethysticollis* Tsch. Consp. p. 37. 207. — Id. Faun. Per. p. 246. 10. — *Mellisuga amethysticollis* Gray Gen. B. I. p. 112. 40. — *Anactoria amethysticollis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Trochilus amethysticollis* Id. Troch. Enum p. 10. —
Bolivien — ♂ — 2 St.

Gen. Eustephanus Rchb. 1849. —

Sephanoides (!) Less. 1832. *Thaumaste* Rchb. 1854.
Stokoesiella (!) Bp. 1854.

171. 1. E. Stokesi Gould

Mon. Troch. VII. t. 4. — *Trochilus Stokesii* King P. Z. S. 1831. p. 30. — Less. Troch. p. 135. t. 50. — Jard. Humm. B. II. p. 55. t. 5 & p. 138. 4. — *Mellisuga Stokesii* Gray Gen. B. I. p. 113. 94. — *Sephanoides Stokesi* Bp. Consp. I. p. 82. gen. 193. 3. — *Thaumaste Stokesii* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. — Id. Troch. Enum. p. 12. —
Juan Fernandez — ♂ — 1 St.

172. 2. E. galeritus Gould

Mon. Troch. III. t. 1. — *Trochilus galeritus* Molina Sag. Ist. Nat. Chil. p. 219. — Gm. S. N. p. 484. 23. — Lath. Ind. Orn. I. p. 304. — Vieill. Enc. p. 532. 17. — *Colibri du Chili* Id. Ois. dor. I. p. 125.— *Mellisuga Kingii* Vig. Z. Journ. III. p. 432. Anm. — *Ornismya sephaniodes* Less. & Garn. Voy. Coqu. Ois. t. 31. 2. — Less. Man. Orn. II. p. 80. — Id. Ois. Mouch. p. 69. t. 4. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 109. t. 5. — *Ornismya sephanioides* Id. Trait. p. 278. 27. — *Trochilus sephanoides* Jard. Humm. B. I. p. 118. t. 12. — Id. l. l. II. p. 138. 13. — Diezmann Colibr. p. 111. t. 12. — *Sephanoides Kingii* Gray List Gen. B. p. 19. — *Trochilus forficatus* Gould (nec Lin.) Voy. Beagl. p. 110.— *Mellisuga galerita* Gray Gen. B. I. p. 113. 93. — *Sephanoides galeritus* Bp. Consp. I. p. 82. gen. 193. 1. — *Trochilus flammifrons* Lyell MSS. —

Chile — ♂ — 3 St.

173. 1. E. fernandensis Gould

Mon. Troch. VII. t. 3. — *Trochilus fernandensis* King P. Z. S. 1831. p. 30. — *Ornismya cinnamomea* Gerv. Mag. Z. 1835. Ois. t. 43. — *Ornismya Robinson* Less. Ois. Mouch. Vel. t. 7. — Delattr. & Less. R. Z. 1839. p. 18. — *Mellisuga fernandensis* Gray Gen. B. I. p. 113. 95. — *Sephanoides fernandensis* Bp. Consp. I. p. 82. gen. 193. 3. —

Juan Fernandez — ♂ — 1 St.

Gen. Streblorhamphus *) Nob. —

Campylopterus Sws. 1837 (nec 1827). *Avocetta* (!) Agass. 184? (nec Briss. 1760). *Avocettula* (!) Rchb. 1849. *Avocettinus* (!) Bp. 1849.

174. 1. S. recurvirostris Nob.

Trochilus recurvirostris Sws. Z. Ill. II. t. 105. — Less. Ois. Mouch. p. 129. t. 37. — Jard. Humm. B. II. p. 80.

---

*) Von στρεβλός (verkehrt) und) ῥάμφος (Schnabel). — Sehr nahe verwandt ist die Gattung:

Opisthoprora Nob. (*Avocettinus* Bp. 1854 nec 1849) von ὀπισθε (rückwärts gebogen) und πρώρα (Vordertheil, Schnabel):

O. euryptera. — *Trochilus eurypterus* Lodd. P. Z. S. 1832. p. 7. — *Trochilus Georginae* Bourc. R. Z. 1847. p. 48. — *Polytmus eurypterus* Gray Gen. B. I. p. 109. 88. — *Polytmus Georginae* Id. l. l. I. p. 109. 89. — *Avocettula eurypteru* Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum. p. 3. t. 679: 4485-86. — *Avocettula Georginae* Id. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum.

t. 3. — Id. l. l. II. p. 142. 31. — Diezmann Colibr. p. 84. t. 3. — *Ornismya recurvirostris* Less. Ois. Mouch. p. XXXVI. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 166. t. 34. — Id. Trait. p. 284. 52. — *Ornismya avocetta* Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 145. t. 24. — Id. Troch. p. 74. t. 23. — *Trochilus avocetta* Jard. Humm. B. I. p. 78. t. 2. — Id. l. l. II. p. 142. 30. — Diezmann Colibr. p. 82. t. 2. — *Mellisuga recurvirostris* Steph. Gen. Z. XIV. p. 248. — *Campylopterus recurvirostris* Sws. Class. B. II. p. 330. — *Hylocharis recurvirostris* Gray Gen. B. I. p. 114. 11. — *Hylocharis avocetta* Id. l. l. I. p. 114. 12. — *Avocettinus recurvirostris* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 174. 1. — *Avocettinus Lessoni* Id. l. l. I. p. 75. gen. 174. 2. — *Avocettula recurvirostris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum. p. 3. t. 679. 4487-89. — Gould Mon. Troch. XI. t. 3. —

Cayenne — ♂ — 2 St.

Gen. Docimastes Gould 1849. —

Mellisuga Gray 1848 (nec Briss. 1760). *Docimaster* (!) Bp. 1849.

175. 1. D. ensifer Gould

Mon. Troch. I. t. 8. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 170. — Scl. B. Bogot. p. 11. 77. — *Ornismya ensifera* Boiss. R. Z. 1839. p. 354.— Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 15. — Lodd. P. Z. S. 1843. p. 122. — *Trochilus derbianus* Fras. l. l. 1840. p. 16. — *Mellisuga ensifera* Gray Gen. B. I. p. 112. 1. — *Docimastes derbyanus* Licht. in Mus. Berol. —

Peru — ♂, ♀; Neu-Granada — ♂, ♀ — 4 St.

Gen. Doryphora *) Rchb. 1854. —

Doryfera (!) Gould 1847. *Dorifera* (!) Bp. 1849. *Hemistephania* Rchb. 1854.

176. 1. D. Ludoviciae Nob.

Trochilus Ludoviciae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. &

p. 3. — *Avocettinus eurypterus* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 62. 206. — Gould Mon. Troch. XI. t. 4. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 23 (Neu-Granada). —

*) Von δορύ (Spiess) und φέρω (tragen). — Die zweite Art dieser durch ihren eigenthümlich lanzenförmigen Schnabel so ausgezeichneten Gattung ist:

Nat. Lyon. 1847. p. 136. — *Mellisuga Ludoviciae* Gray Gen. B. I. p. 112. 19. — *Dorifera Ludoviciae* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 151. 1. — Gould Mon. Troch. VI. t. 4. — Scl. B. Bogot. p. 11. 78. — *Hemistephania Ludoviciae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Helianthea Ludoviciae* Id. Troch. Enum. p. 6. t. 731. 4673-74. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. LAMPROPYGIA *) Rchb. 1854. —

Caeligena Bp. 1849 (nec Less. 1832).

177. 1. L. coeligena Nob.

Ornismya coeligena Less. Troch. p. 141. t. 53. — *Trochilus coeligena* Jard. Humm. B. II. p. 53. t. 4. — *Lampornis coeligena* Id. l. l. II. p. 156. 11. — *Mellisuga coeligena* Gray Gen. B. I. p. 112. 15. — *Coeligena typica* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 164. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 686. 4515. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 11. — Scl. B. Bogot. p. 12. 82. —

Neu-Granada — ♂; Caracas — ♂ — 2 St.

D. *Johannae.* — *Trochilus Johannae* Bourc. P. S. S. 1847. p. 45. — Id. R. Z. 1847. p. 257. — *Trochilus violifrons* Gould P. Z. S. 1847. p. 95. — *Mellisuga Johannae* Gray Gen. B. I. p. 110. 20. — *Dorifera violifrons* Gould MSS. — *Dorifera Johannae* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 151. 2. — Gould Mon. Troch. VI. t. 5. — Scl. B. Bogot. p. 11. 79. — *Hemistephania Johannae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Helianthea Johannae* Id. Troch. Enum. p. 6. t. 731. 4675-76 (Peru, Neu-Granada). —

*) Unter diesen Namen sondert Reichenbach den *Trochilus Wilsoni* Bourc. & Delattr. generisch von *Coeligena typica* Bp., aus welchem Grunde, sind wir nicht im Stande zu errathen. Vielmehr halten wir jene beiden Arten durchaus für generisch untrennbar und möchten desshalb die von Reichenbach vorgeschlagene Benennung *Lampropygia* auf alle, gewöhnlich nach Bonaparte's Vorgange *Coeligena* genannten Arten ausdehnen; da dieser Name von Lesson zuerst für die bereits oben erwähnte *C. Clemenciae*, nicht für die hier in Rede stehenden Arten angewandt wurden. Es würden somit ausser *L. coeligena* noch zu *Lampropygia* in diesem weitern Sinne zu stellen sein:

2. *L. purpurea.* — *? Coeligena sp.* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 164. 2. — *Coeligena purpurea* Gould Mon. Troch. VIII. t. 12. — Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 753. 4727-28 (? Peru);
3. *L. Wilsoni* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Wilsoni* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 305. — *Mellisuga Wilsoni* Gray Gen. B. I. p. 112. 16. — *Bourcieria Wilsoni* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 4. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 751. 4723-24. — *Coeligena Wilsoni* Gould Mon. Troch. XI. t. 11 (Neu-Granada). —

Gen. Homophania *) Rchb. 1854. —

Bourcieria (!) Bp. 1849. *Hamophania* (!) Rchb. 1855.

178. 1. H. torquata Nob.

Ornismya torquata Boiss. R. Z. 1840. p. 6 (ad.). — *Trochilus (Lampornis) insectivorus* Tsch. Consp. p. 38. 211. — Id. Faun. Per. p. 248. 14. t. 23. 1 (jun.). — *Mellisuga torquata* Gray Gen. B. I. p. 112. 12. — *Bourcieria torquata* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 2. — Gould Mon. Troch. VII. t. 8. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 748. 4716-17. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 2. 6. —

Neu-Granada — 2 ♂ ad., ♂ jun. — 3 St.

179. 2. H. Prunellei Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Prunelli* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 36. t. 1. — Iid. R. Z. 1843. p. 70. — *Mellisuga Prunelli* Gray Gen. B. I. p. 112. 11. — *Bourcieria Prunelli* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 1.— Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 750. 4721-22.— Scl B. Bogot. Add. II. p. 2. 7.— *Coeligena Prunelli* Gould Mon. Troch. XIV. t. 9. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. Heliantea **) Bp. 1848. —

Hypochrysia & *Conradinia* (!) Rchb. 1854.

180. 1. H. typica Bp.

Consp. I. p. 74. gen. 171. 1. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 5. — Scl. B. Bogot. p. 11. 80. — Rchb. Troch. Enum.

---

*) Wir zählen u. a. noch hierher:

3. *H. inca.* — *Bourcieria inca* Gould Contr. Orn. 1852. p. 136. — Id. Mon. Troch. VII. t. 10. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 752. 4725-26 (Bolivien);

4. *H. fulgidigula.* — *Bourcieria fulgidigula* Gould Mon. Troch. VII. t. 9. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 749. 4718-19 (Ecuador). —

**) Hierher werden gewöhnlich ausserdem noch gerechnet:

3. *H. Lutetiae* Bp. Consp. I. p. 74. gen. 171. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 736. 4687-88. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 5. — *Trochilus Lutetiae* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 307. — *Mellisuga Lutetiae* Gray Gen. B. I. p. 112. 7 (Ecuador);

4. *H. eos* Gould P. Z. S. 1848. p. 11. t. 1. — Bp. Consp. I. p. 75. gen. 171. 5. — Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 633. 4680-82. — Gould Mon. Troch. X. t. 7. — *Mellisuga eos* Gray Gen. B. III. App. p. 5. — *Hypochrysia eos* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9 (Merida);

p. 6. t. 732. 4677-78. — *Ornismya helianthea* Less. R. Z. 1838. p. 314. — *Mellisuga helianthea* Gray Gen. B. I. p. 112. 6. — *Trochilus porphyrogaster* Licht. in Mus. Berol.— Neu-Granada — 3 ad., ♂ jun. — 4 St.

181. 2. H. Bonapartei Bp.

Consp. I. p. 74. gen. 171. 2. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 6. — Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 734. 4683-84. — Scl. B. Bogot. p. 11. 81. — *Ornismya Bonapartei* Boiss. R. Z. 1840. p. 6. — Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1840. p. 307. t. 14. — *Trochilus auregaster* Lodd. P. Z. S. 1840. p. 16. — *Mellisuga Bonapartei* Gray Gen. B. I. p. 112. 8. — *Hypochrysia Bonapartei* Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — *Trochilus chrysogaster* Licht. in Mus. Berol. — Neu-Granada — ♂ — 3 St.

Gen. PTEROPHANES Gould 1849. —

182. 1. P. Temmincki Gould

Mon. Troch. I. t. 7. — Bp. Consp. I. p. 70. gen. 158. — Scl. B. Bogot. p. 11. 76. — *Ornismya Temminckii* Boiss. R. Z. 1839. p. 354.— Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 14. — *Trochilus cyanopterus* „Lodd." Fras. P. Z. S. 1840. p. 17. — *Mellisuga Temminckii* Gray Gen. B. I. p. 112. 10. — Bolivien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Gen. HYPERMETRA *) Nob. —

Cynanthus Less. 1829 (nec Sws. 1827). *Patagona* (!) Gray 1840. *Hylocharis* Id. 1848 (nec Boie 1831).

---

5. *H. violifera* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 171. 4. — Gould Mon. Troch. X. t. 6. — *Trochilus violifer* Id. P. Z. S. 1846. p. 87. — *Mellisuga violifera* Gray Gen. B. I. p. 112. 9 (Peru und Bolivien);
6. *H. aurora* Gould P. Z. S. 1853. p. 61. 2. — *Hypochrysia aurora* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9 (?);
7. *H. Conradi.* — *Trochilus Conradi* Bourc. P. Z. S. 1847. p. 45. — *Mellisuga Conradi* Gray Gen. B. I. p. 112. 14. — *Bourcieria Conradi* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 747. 4714-15. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 2. — *Conradinia Conradi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10 (Caracas). —

*) Von ὑπέρμετρος (übermässig gross). —

183. 1. H. gigas Nob.

Trochilus gigas Vieill. Gal. Ois. II. p. 296. t. 180. — Jard. Humm. B. II. p. 50. t. 3. — *Ornismya tristis* Less. Ois. Mouch. p. 43. t. 3. — Id. Trait. p. 272. 1. — *Cynanthus gigas* Jard. Humm. B. II. p. 149. 31. — *Ornismya gigantea* Orb. & Lafr. Syn. p..... — *Patagona gigas* Gray List Gen. B. p. 18. — Bp. Consp. I. p. 75. gen. 172. — Gould Mon. Troch. IX. t. 6. — *Hylocharis gigas* Gray Gen. B. I. p. 114. 1. — Bolivien — ♂ ad.; Peru — ♂ juv.; Chile — ♂ ad., ♀ — 4 St.

Fam. CYPSELIDÆ. Segler.

Gen. Collocalia Gray 1840. — Salangane.

Salangana (!) Streubel 1848. *Colocalia* (!) Gould.

184. 1. C. francica Gray

Gen. B. III. App. p. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 21. 4. — Bp. Consp. I. p. 343. gen. 734. 4. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 15. 4. — *Hirundo francica* Gm. S. N. p. 1017. 15. — Lath. Ind. Orn. II. p. 580. 28. — ? *Macropteryx spodiopygius* Peale Un. St. Expl. Exped. p. 176. t. 49. 2. — Hartl. Wiegm. Arch. Nat.-Gesch. XVIII. 1. p. 112. 101. —

Isle de France — ♀ — 1 St.

Gen. Dendrochelidon Boie 1828. — Baum-Segler.

Macropteryx & *Macropterus* Sws. 1832. *Pallestre* (!) Less. 1838. *Palaestra* Agass. 1848. *Chelidonia* & *Hemiprocne* Streubel 1848 (nec Nitzsch 1840).

185. 1. D. comata Boie

Isis 1844. p. 166. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 110. 128. — *Cypselus comatus* Temm. Pl. col. 268. — *Macropteryx comatus* Sws. Class. B. II. p. 340. — Gray Gen. B. I. p. 54. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 17. 3. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 87. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 15. 2. — *Apus (Pallestre) comatus* Less. Compl. Buff. VIII. p. 491. —

Sumatra — ♂ — 1 St.

186. 2. D. mystacea Boie

Isis 1844. p. 166. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 5. — *Cypselus mystaceus* Less. Voy. Coqu. I. p. 647. Ois. t. 22. — *Macropteryx mystaceus* Sws. Class. B. II. p. 340. — Gray Gen. B. I. p. 54. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 17. 4. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 15. 1. — *Apus (Pallestre) mystaceus* Less. Compl. Buff. VIII. p. 491. —

Neu-Guinea — ♂ — 1 St.

187. 3. D. klecho Boie

Isis 1844. p. 165. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 2. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 110. 129. — *Hirundo klecho* Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 143. — *Hirundo urbica* Raffl. (nec Lin.) l. l. XIII. p. 315. — *Cypselus longipennis* Temm. Pl. col. 83. 1. — *Cypselus klecho* Steph. Gen. Z. XIII. p. 81. — *Macropteryx longipennis* Sws. Z. Ill. n. s. t. 74. — *Apus (Pallestre) klecho* Less. Compl. Buff. VIII. p. 490. — *Macropteryx klecho* Gray List Gen. B. p. 11. — Id. Gen. B. I. p. 54. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 17. 1. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 87. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 15. 3. —

Java — ♂ ad., ♂ juv., ♀ ad. — 3 St.

Gen. CHAETURA Steph. 1825. — Stachelshwanz-Segler.

Acanthylis (!) Boie 1826. *Pelasgia* Geoffr. *Hirundapus* (!) Hodgs. 1836. *Pallene* Less. 1837 (nec Meg. 1823). *Acanthyllis* Agass. 1848.

188. 1. C. caudacuta Nob.

Hirundo caudacuta Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 57. — Vieill. Enc. p. 531. 53. — ? *Hirundo pacifica* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 58. — Vieill. Enc. p. 529. 43. — ? *Hirundo fusca* Steph. Gen. Z. X. p. 133. — *Chaetura australis* Id. l. l. XIII. p. 76. — *Chaetura macroptera* Sws. Z. Ill. n. s. t. 42 — *Pallene macroptera & caudacuta* Boie Isis 1844. p. 168. — *Acanthylis caudacuta* Gray Ann. Nat. Hist. 1843. p. 194. — Id. Gen. B. I. p. 55. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 15. 1. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 37. 1. — Gould B. Austr. II. t. 10. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 183. 221. — Bp. Consp. I. p. 64. gen. 144. 12. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 11. 8. —

Australien — ♂ — 1 St.

Gen. HEMIPROCNE Nitzsch 1840 — Schwalben-Segler.

189. 1. H. zonaris Nob.

Hirundo zonaris Shaw Mill. Cim. Phys. t. 55. — *Hirundo albicollis* Vieill. N. D. XIV. p. 524. — Id. Gal. Ois. II. t. 120. — *Hirundo collaris* Wied Reis. Bras. I. p. 75 & p. 336. — *Cypselus collaris* Temm. Pl. col. 195. — Wied Beitr. III.

p. 344. 1. — *Chaetura collaris* Steph. Gen. Z. XIII. p. 76. — *Apus (Pallene) collaris* Less. Compl. Buff. VIII. p. 493. — *Hemiprocne collaris* Nitzsch Syst. Pterylograph. p. 123. 1a. — *Pallene collaris* Boie Isis 1844. p. 168. — *Acanthylis collaris* Gray Gen. B. I. p. 55. 6. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. III. 1. p. 15. 3. — Bp. Consp. I. p. 64. gen. 144. 9. — Burm. Th. Bras. II. p. 365. — *Acanthylis zonaris* Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 11. 9. — *Cypselus torquatus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. Cypselus Ill. 1811. — Segler.

Apus Scop. 1777 (nec Schäff. 1756). ?*Micropus* Wolf & Meyer 1810. *Brachypus* Meyer 1815. *Cypsiurus* (!) Less. 1843.

190. 1. C. melba Ill.

Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 230. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 134. — Naum. Vög. Deutschl. VI. p. 115. t. 147. 1. — Gould B. Eur. t. 35. 2. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 55. — Gray Gen. B. I. p. 54. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 18. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. Brit. p. 35. 1. — Bp. Consp. I. p. 65. gen. 145. 1. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 9. 1. — *Hirundo melba* Lin. S. N. p. 345. 11. — Lath. Ind. Orn. II. p. 582. 33. — *Hirundo alpina* Scop. Ann. I. p. 166. 252. — *Micropus alpinus* Meyer & Wolf Taschenb. Vögelk. I. p. 282. — *Cypselus alpinus* Temm. Man. Orn. p. 270. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 134. — *Apus melba* Cuv. Règn. Anim. I. p. 373. — *Cypselus gutturalis* Vieill. N. D. XIX. p. 422. — *Hirundo gularis* Steph. Gen. Z. X. p. 99. — *Micropus melba* Boie Isis 1844. p. 165. —

Schweiz — ♂ — 1 St.

191. 2. C. apus Ill.

Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 230. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 136. — Naum. Vög. Deutschl. VI. p. 123. 184. t. 147. 2. — Gould B. Eur. t. 53. — Keys. & Blas Wirbelth. Eur. p. 33. 56. — Gray Gen. B. I. p. 54. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 18. 2. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. Brit. p. 36. 2. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 85. — Bp. Consp. I. p. 65. gen. 145. 2. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 9. 3. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 109. 126. — *Hirundo apus* Lin. S. N. p. 344. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 582. 32. — *Micropus murarius* Wolf & Meyer Taschenb. Vögelk. I. p. 281. — *Cypselus murarius* Temm. Man. Orn. p. 271. — Brehm

Vög. Deutschl. p. 135. — *Brachypus murarius* Meyer Vög. Livl. & Esthl. p. 143.— *Cypselus niger* Leach Cat. Mamm. & B. B. Mus. p. 19. — *Apus sp.* Cuv. Règn. Anim. I. p. 373. — *Cypselus vulgaris* Steph. Gen. Z. X. p. 72. — *Micropus apus* Boie Isis 1844. p. 165. —
Harz — ♂ ad., 2 ♀ ad., ♀ juv. — 4 St.

192. 3. C. caffer Licht.

Doubl. p. 58. 602. — Gray Gen. B. I. p. 54. 2. — Bp Consp. I. p. 65. gen. 145. 3. — Cassin Cat. Hir. Mus. Philad. p. 9. 4. — *Hirundo apus var.* Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. I. p. 540. 160. var. β. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 56. Anm. — *Cypselus pygargus* Temm. Pl. col. 460. 1. — Gray Gen. B. I. p. 54. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 19. 4. — Bp. Consp. I. p. 65. gen. 145. 6. — *Apus pygargus* Less. Compl. Buff. VIII p. 490. — *Atticora pygargus* Boie Isis 1844. p. 172. — *Cypselus leucothea* Smith in Mus. Philad. —
Sennaar — ♀ — 1 St.

193. 4. C. ambrosiacus Gray

List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 19. 7.— Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 10. 8. — Hartl. Orn. Westafr. p. 24. 62. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859. p. 33. — Hartl. Journ. Orn. 1860. p. 82. 1. — *Hirundo ambrosiaca* Gm. S. N. 1021. 23.— Lath. Ind. Orn. II. p. 575. 9. — *Cypselus parvus* Licht. Doubl. p. 58. 601. — Temm. Pl. col. 460. 2. — Less. Trait. Orn. p. 268. 4. - Streubel Isis 1848. p. 351. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 10. 10. — *Cypsiurus ambrosiacus* Less. Ech. Mond. Sav. 1843. p. 134. — *Atticora ambrosiaca* Boie Isis 1844. p. 172.— *Macropteryx ambrosiacus* Gray Gen. B. I. p. 54. 4. — *Dendrochelidon ambrosiaca* Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 1.— „? *Hirundo americana* Lath. (nec Wils.)" Streubel. —
Nubien — ♀ — 1 St.

Fam. CAPRIMULGIDÆ. Ziegenmelker.

Subfam. CHORDEDILINÆ. Schwalben-Ziegenmelker.

Gen. Chordediles Sws. 1831. — Schwalben-Ziegenmelker.

Chordeiles (!) Sws. 1831. *Chordeilus* (!) Gray 1840. *Microrhynchus* Less. 1847 (nec Meg. 1825).

194. 1. C. virginianus Sws.

Faun. Bor. Amer. II. p. 337. 496. — Bp. B. Eur. & N.-Amer. p. 8. 44. — Gray Gen. B. I. p. 49. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 13. 1. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 142. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 186. art. 19. 1. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 1. — *Caprimulgus virginianus* Gm. S. N. p. 1028. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 585. 6. — Aud. B. N.-Amer. II. p. 273. t. 147. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 32. 43. — *Caprimulgus americanus* Wils. (nec Auct.) Amer. Orn. V. p. 65. t. 40.— *Caprimulgus popetue* Vieill. Ois. Amér. sept. I. p. 56. t. 24. —

Nord-America — ♂, ♀ — 2 St.

195. 2. C. minor Cab.

Journ. Orn. 1856. p. 5. 84. — *Chordeiles virginianus* Lembeye (nec Gm.). — *Caprimulgus Gundlachii* Lawrence. Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York. VI. (1856) p. 166. —

Cuba — ♂, ♀ — 2 St.

196. 3. C. sapiti Bp.

Consp. I. p. 63. gen. 142. 2. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 186. art. 19. 5. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 5. — Id. Illustr. B. N.-Amer. p. 238. — *Caprimulgus sapiti* Natt. in Mus. Vindob. — ? *Chordeiles texensis* Lawr. Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York. VI. (1856) p. 167. —

Mexico — ♂ — 1 St.

197. 4. C. brasilianus Bp.

Consp. I. p. 63. gen. 142. 10. — Cassin Proc. Acad. Nat.

Sc. Philad. 1851. p. 186. art. 19. 2 & p. 187. art. 20. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 2. — *Caprimulgus brasilianus* Gm. S. N. p. 1031. 11. — Lath. Ind. Orn. II. p. 586. 10. — Vieill. Enc. p. 542. 10. — *Ibiyau jaspeado* Azar. Apunt. no. 313. — *Caprimulgus guianensis* Sonnin. (nec Lin.) Voy. Azar. IV. p. 120. — Hartl. Ind. Azar. p. 20. 313. — *Caprimulgus variegatus* Vieill. N. D. X. p. 238. — Id. Enc. p. 539. — Orb. & Lafr. Syn. p. 68. — *Caprimulgus noitibo* Vieill. N. D. X. p. 240. — *Caprimulgus jaspideus* Merrem Ersch & Grub. Encycl. Wissensch. & Künst. XV. p. 148. — *Caprimulgus semitorquatus* Wied (nec Gm.) Beitr. III. p. 330. 6. — Tsch. Faun. Per. p. 130. 1. — *Caprimulgus pruinosus* „Licht." Tsch. Consp. p. 8. 37. — Id. Faun. Per. t. 6. 2. — *Chordediles peruvianus* Peale Un. St. Explor. Exped. p. 172. t. 48. 2. — *Chordediles pruinosus* Burm. Th. Bras. II. p. 394. 3. —

Peru — ♀ juv. — 1 St.

Gen. UROCOLUS *) Nob. — Stutzschwanz - Ziegenmelker.

Lurocalis (!?) Cassin 1851.

198. 1. U. Nattereri Nob.

Caprimulgus Nattereri Temm. Pl. col. 107. — *Caprimulgus brachyurus* „Licht." Nordm. Erm. Reis. Alt. p. 16. 112. — *Podager Nattereri* Gray Gen. B. I. p. 52. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 14. 2. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 143. 2. — *Lurocalis Nattereri* Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 189. art. 23. 1 & p. 190. art. 25. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 1. — *Chordeiles Nattereri* Bnrm. Th. Bras. II. p. 398. 6. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

*) Cassin hat leider, wie gewöhnlich, keine Ableitung seines Gattungsnamens *Lurocalis* gegeben, so dass uns derselbe unverständlich bleibt. Wir setzen daher an dessen Stelle: *Urocolus* von οὐρα (Schwanz) und κόλος (gestutzt, verkürzt). —

Als zweite kleinere, durch verhältnissmässig kürzere Flügel und längern Schwanz vom Typus abweichende, sonst aber demselben sehr ähnlich gebildete und gefärbte Art gehört hierher:

U. semitorquatus. — *Petit Engoulevent tacheté de Cayenne* Buff. Pl. enl. 734. — *Caprimulgus semitorquatus* Gm. Syst. Nat. p. 1031. 12. — *Podager Gouldii* Gray Gen. B. I. p. 52. 3. t. 18. — *Lurocalis semitorquatus* Cassin Proc. Acad. Philad. 1851. p. 189. art. 23. 2.— Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 2 (Cayenne, Guiana, im berliner Museum ein Exemplar von Cameta). —

Gen. PODAGER Wagl. 1832. — Tag-Ziegenmelker.

Proïthera Sws. 1837.

199. 1. P. nacunda Gray

List Gen. B. p. 10. — Id. Gen. B. I. p. 52. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 14. 1. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 143. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 188. art. 22.— Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 14. 1.— Burm. Th. Bras. II. p. 400. — *Nacunda* Azar. Apunt. no. 312. — *Caprimulgus nacunda* Vieill. N. D. X. p. 240. — Id. Enc. p. 538. — Merrem Ersch & Grub. Enc. Wissensch. & Künst. XV. p. 148. — Hartl. Ind. Azar. p. 20. 312. — *Caprimulgus diurnus* Wied Reis. Bras. II. p. 174 & p. 344. — Id. Beitr. III. p. 326. 5. — Temm. Pl. col. 182. — *Caprimulgus campestris* Licht. Doubl. p. 59. 605. — *Podager diurnus* Wagl. Isis 1832. p. 277. — *Proïthera diurna* Sws. Class. B. II. p. 339. —

Guiana — ♂ — 1 St.

Subfam. CAPRIMULGINÆ. Ziegenmelker.

Gen. CAPRIMULGUS Lin. 1756. — Ziegenmelker.

Nyctichelidon Rennie 1831.

200. 1. C. europaeus Lin.

S. N. p. 346. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 584. 5. — Vieill. Enc. p. 535. 1. — Naum. Vög. Deutschl. VI. p. 141. 185. t. 148. — Gould B. Eur. t. 51. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 57. — Gray Gen. B. I. p. 47. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 5. 1. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 34. 1. — Bp. Consp. I. p. 59. gen. 134. 1. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 3. 1. — *Caprimulgus punctatus* Wolf & Meyer Taschenb. Vögelk. I. p. 284. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 130. — *Caprimulgus maculatus* Id. l. l. I. p. 131. t. 10. 1. — *Caprimulgus vulgaris* Vieill. Faun. Franç. I. p. 140. — Roux Orn. Prov. I. p. 240. t. 147. — *Nyctichelidon europaeus* Rennie. Mont. Orn. Dict. p. 335. —

Harz — 2 ♂, 3 ♀ — 5 St.

201. 2. C. ruficollis Temm.

Man. Orn. I. p. 438. — Gould B. Eur. t. 52. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 58. — Gray Gen. B. I. p. 47. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 6. 2. — Bp. Consp. I. p. 59. gen. 134. 2. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 3. 3. — *Caprimulgus rufitorquis* Vieill. Enc. p. 546. 33. — *Caprimulgus rufitorquatus* Id. Faun. Franç. I. p. 142. —

Tanger — ♂; Spanien — ♂ — 2 St.

202. 3. C. aegyptius Licht.

Doubl. p. 59. 610. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 4. 9. — *Caprimulgus isabellinus* Temm. Pl. col. 379. — Rüpp. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 22. 64. — Gray Gen. B. I. p. 47. 7. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 6. 4. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 134. 7. — *Caprimulgus aegyptiacus* Aliq. —

Egypten — 2 ♂, ♀ — 3 St.

203. 4. C. nubicus Licht.

Doubl. p. 59. 611. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 4. 10. — *Caprimulgus infuscatus* Rüpp. Z. Atl. Vög. t. 6. — Id. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 21. 61. — Gray Gen. B. I. p. 47. 6. — Bp. Consp. I. p. 59. gen. 134. 6. —

N.-O.-Africa — ♂ — 2 St.

204. 5. C. pectoralis Cuv.

Règn. Anim. I. p. 376. — Vieill. Enc. p. 545. 31. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 7. 7. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 134. 12. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 3. 4. — *Engoulevent à collier* Levaill. Ois. Afr. I. p. 186. t. 49. — *Caprimulgus asiaticus* (!) Vieill. (nec Lath.) N. D. X. p. 233. — Licht. Doubl. p. 59. 609. — Gray Gen. B. I. p. 47. 7. — Griff. Anim. Kingd. VII. p. 75. — *Caprimulgus africanus* Steph. Gen. Z. X. p. 157. — *Caprimulgus atrovarius* Sundev. Oefvers. Kongl. Acad. Vetensk. Förhandl. 1851. p. 128. —

Port-Natal — ♂ — 1 St.

205. 6. C. macrurus Horsf.

Trans. Linn. Soc. XIII. p. 142. — Blyth Cat. Mus. A. S. B. p. 83. — Jerd. Ill. Ind. Orn. p. . . no. 3. — Gray Gen. B. III. App. p. 3. — Gould B. Austr. II. t. 9. — Rchb. Vög.

Neuholl. I. p. 185. 223. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 134. 24. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 5. 13. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 112. 132. —
Malacca — ♂; Sumatra — ♂; Java — ♂ — 3 St.

Gen. SCOTORNIS Sws. 1837. — Langschwanz-Ziegenmelker.

Scortornis (!) Sws. 1837.

206. 1. S. longicauda Cassin

Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 6. 1. — *Caprimulgus longicaudus* Drapiez Dict. Class. Hist. Nat. VI. p. 169. — Steph. Gen. Z. XIII. p. 89. — *Caprimulgus climacurus* Vieill. Gal. Ois. II. p. 195. t. 122. — *Scotornis climacteris* Sws. Class. B. II. p. 339. — Id. B. W.-Afr. II. p. 66. — Gray List Gen. B. p. 10. — *Scotornis climacturus* (!) Gray Gen. B. I. p. 51. 1. — *Scotornis climacturus* (!) Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 12. 1. — Bp. Consp. I. p. 62. gen. 140. 1. — Hartl. Orn. Westafr. p. 23. 56. — ? *Caprimulgus Wiederspergii* Rchb. Allg. Deutsch. Naturh. Zeit. 1846. III. p. 269. t. 9. —
N.-O.-Africa — 2 ♂; West-Africa — ♀ — 3 St.

Gen. MACRODIPTERYX Sws. 1837. — Flaggen-Ziegenmelker.

Macrodypteryx (!) Bp. 1849. *Macrodipterix* (!) Cassin 1851.

207. 1. M. longipennis Gray

List Gen. B. p. 10. — Id. Gen. B. I. p. 52. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 13. 3. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 141. 1. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 6. 1. — Hartl. Orn. Westafr. p. 23. 60. — *Caprimulgus longipennis* Shaw Nat. Misc. t. 265. — „*Caprimulgus macrodipterus* Afzel. Descript. Sierr. Leon." & *Macrodipteryx africanus* Sws. B. W.-Afr. II. p. 62. t. 5. —
N.-O.-Africa — ♂ — 1 St.

Gen. ANTROSTOMUS Gould 1838. — Whippoorwill.

Anthrostomus (!) & *Anthrostumus* (!!) Hartl. 1851.

208. 1. A. carolinensis Bp.

B. Eur. & N.-Amer. p. 8. 42. — Gray List Gen. B. p. 9. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 135. 1. — Cassin Proc. Acad.

Nat. Sc. Philad. 1851. p. 183. art. 10. 1 & art. 11.—Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 14. 1.— Cab. Journ. Orn. 1856. p. 6. 86.— Baird Rep. Expl. & Surv. Railr. Rout. Pacif. Oc. IX. 2. p. 147. — *Caprimulgus carolinensis* Gm. S. N. p. 1028. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 584. 4. — Aud. B. N.-Amer. p. 273. t. 52 & V. p. 401. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 31. 41. — Gray Gen. B. I. p. 48. 23. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 9. 22.—*Caprimulgus lucifugus* Bartram Trav. through N.- & S.-Carolin. etc. p. 292.— *Caprimulgus rufus* Vieill. (nec Bodd. & Gm.) Ois. Amér. Sept. I. p. 57. t. 25 (♀). — *Caprimulgus brachypterus* Steph. Gen. Z. X. p. 150. —

Cuba — ♂, ♀ — 2 St.

209. 2. A. nigrescens Nob.

Caprimulgus semitorquatus Gray (nec Gm.) Gen. B. I. p. 47. t. 17. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 9. 18. — *Caprimulgus nigrescens* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 710. 207. — *Stenopsis nigrescens* Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 14. 4. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. Stenopsis Cassin 1851. — Schnurrer.

210. 1. S. cayennensis Cassin

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 179. art. 5. 1. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 1.—*Engoulevent de Cayenne* Buff. Pl. enl. 760. — *Caprimulgus cayennensis* Gm. S. N. p. 1031. 13. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 710. 205. — Burm. Th. Bras. II. p. 388. Anm. 1. — *Caprimulgus cayanus* Lath Ind. Orn. II. p. 587. 12. — *Ibiyau alas y cola blanca* Azar. Apunt. no. 314. — *Caprimulgus leucurus* Vieill. N. D. X. p. 246. — Id. Enc. p. 544. 24.— *Caprimulgus leopetes* Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 87. — *Caprimulgus odontopteron* Less. R. Z. 1839. p. 105. — Id. Compl. Buff. XX. p. 260. — *Caprimulgus cayanensis* Hartl. Ind. Azar. p. 30. 314.— Gray Gen. B. I. p. 48. 26.— Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 8. 15. — *Antrostomus cayanensis* Bp. Consp. I. p. 61. gen. 135. 6. — *Antrostomus odonpteron* (!) Id. l. l. I. p. 61. gen. 135. 9. —

Cayenne — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Gen. NYCTIDROMUS Gould 1838. — Nachtläufer.

Nyctydromus (!) Aliq. *Eucapripodus* Less. 1843. *Lucapripodus* (!) Id. 1847.

211. 1. **N. americanus** *) Cassin

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 179. art. 6.1 & p. 180. art. 7. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 1. — Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 125. 173. — *Caprimulgus americanus* Lin. S. N. p. 346. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 587. 14. — *Tette-chevre roux de la Guiane* Buff. Pl. enl. 733. — *Caprimulgus albicollis* Gm. S. N. p. 1030. 8. — Lath. Ind. Orn. II. p. 575. 7. — Vieill. Enc. p. 536. 4. — Licht. Doubl. p. 59. 606. — Hartl. Ind. Azar. p. 20. 310. — Orb. & Lafr. Syn. p. 67. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 710. 204. — *Caprimulgus guianensis* Gm. S. N. p. 1030. 10. — Lath. Ind. Orn. II. p. 586. 8. — Wied Beitr. III. p. 318. 4. — *Ibiyau* Azar. Apunt. no. 310. — *Caprimulgus laticaudatus* Drapiez Dict. Class. Hist. Nat. VI. p. 169. — *Nyctidromus Derbyanus* Gould Icon. Av. II. t. 2.— Gray Gen. B. I. p. 48. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 11. 1. — Bp. Consp. I. p. 62. gen. 136. 2. — *Chordeiles americanus* Gray Gen. B. I. p. 49. 2. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 142. 3.—*?Nyctidromus affinis* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 11. 2. — *? Caprimulgus grallarius* Wied in Mus. Lugd. — *?Nyctidromus grallarius* Bp. Consp. I. p. 62. gen. 136. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 179. art. 6. 3 & p. 183. art. 9. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 3. — Scl. B. Bogot. p. 7. 20. — Burm. Th. Bras. II. p. 392. Anm. — *Nyctidromus guianensis* Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. 1851. p. 189. art. 6. 2 & p. 183. art. 8. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 391. 2 — *Nyctidromus albicollis* Id. l. l. II. p. 389. 1. —

Xalapa — 2 ♂, 1 ♀; Porto Cabello — ♀; Guiana — ♂; Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 9 St.

---

*) Der obige nunmehr nach Cassin's Vorgange als der älteste anerkannte Name passt ganz gut für diese Art, welche in der That eine der weitest verbreiteten Amerika's zu sein scheint. Wir haben Gelegenheit gehabt Exemplare aus den verschiedensten Gegenden vom südlichen Brasilien bis Mexico hinauf, aus Para, Guiana, Venezuela, Aragua, Bogota und Costa-Rica zu untersuchen, und hat es uns durch diesen Umstand nur um so weniger gelingen wollen, irgend welche haltbare specifische Unterschiede aufzufinden. Im Allgemeinen scheinen die südbrasilianischen grösser zu sein *(Derbyanus?)*, nach den Tropen zu, in Cayenne, Guiana etc. sind sie kleiner *(guianensis)*, werden aber nordwärts vom Isthmus von Panama nach Mexico hin wieder grösser, so dass sich am ehesten Mexicaner und Südbrasilianer als die grosse Raçe absondern liessen. Sonstige Abweichungen sind lediglich in Alters- und Geschlechts-Zuständen begründet; und haben sich uns weder die von Cassin, noch die von Burmeister angegebenen Unterscheidungsmerkmaale der beiden von diesen Autoren angenommenen Arten irgendwie als genügend oder stichhaltig erwiesen.

Gen. ELEOTHREPTUS Gray 1840.—Säbelflügel-Ziegenmelker.

Amblypterus Gould 1837 (nec Agass. 1833).

212. 1. E. anomalus Gray

List Gen. B. p. 10. — Id. Gen. B. I. p. 49. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 10. 1. — Bp. Consp. I. p. 62. gen. 137. — Burm. Th. Bras. II. p. 383. — *Amblypterus anomalus* Gould P. Z. S. 1837. p. 105. — Id. Icon. Av. II. t. 1. — *Caprimulgus mixtus* Licht. in Mus. Berol. — *Caprimulgus mercurius* Natt. in Mus. Vindob. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. HYDROPSALIS Wagl. 1832 Scheerenschwanz-Ziegenmelker.

Psalurus Sws. 1837. *Hydropsalia* (!) Gray 1840. *Hydropsallis* (!) Rchb. 1850.

213. 1. H torquata Cassin

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 176. art. 3. 1 & art. 4. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 13. 1. — *Caprimulgus torquatus* Gm. S. N. p. 1032. 15. — Lath. Ind. Orn. II. p. 587. 15 (♀). — *Ibiyau cola de tixera* Azar. Apunt. no. 309. — *Caprimulgus furcifer* Vieill. N. D. X. p. 242. — Id. Enc. p. 542. 21. — Hartl. Ind. Azar. p. 19. 309. — Gray Gen. B. I. p. 48. 18. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 9. 23. — ? *Caprimulgus manurus* Vieill. N. D. X. p. 239. — Gray Gen. B. I. p. 48. 21. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 10. 26. — *Caprimulgus psalurus* Temm. Pl. col. 157. — *Caprimulgus grandis* Licht. (nec Gm.) Doubl. p. 58. 604. — *Caprimulgus fissicaudus* Merrem Ersch & Grub. Enc. W. & K. XV. p. 148. — *Hydropsalis Azarae* Wagl. Isis 1832. p. 1222. — Orb. & Lafr. Syn. p. 67. — *Psalurus macropterus* Sws. Class. B. II. p. 339. — *Hydropsalis furcifer* Gray List Gen. B. p. 10. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 711. 203. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 153. 1. — *Hydropsalis psalurus* Id. l. l. I. p. 59. gen. 153. 4. — Burm. Th. Bras. II. p. 381. 2. — ? *Hydropsalis manurus* Bp. Consp. I. p. 59. gen. 153. 5. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Subfam. NYCTIBIINÆ Tagschläfer.

Gen. NYCTIBIUS Vieill. 1816. — Ibiyau.

Caprimulgus Lath. 1790 (nec Lin. 1756). ? *Ibijus* (!) Rafinq. 1815. *Nyctornis* Nitzsch 1840.

214. 1. N. grandis Vieill.

N. D. XVI. p. 7. — Lafr. Mag. Z. 1837. Ois. p. 23. — Gray List Gen. B. p. 9. — Id. Gen. B. I. p. 46. 1. t. 16. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 4. 1. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 711. 210. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 131. 1.— Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 184. art. 14. 1 & art. 15. 1.—Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 7. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 374. 1. — *Grand crapaud-volant de Cayenne* Buff. Pl. enl. 325. — *Caprimulgus grandis* Gm. S. N. p. 1029. 7. — Lath. Ind. Orn. II. p. 383. 1. — Vieill. Enc. p. 546. 32. — Wied Beitr. III. p. 295. 1. — Jard. & Selby Ill. Orn. t. 89. — *Caprimulgus maximus* Shaw Mus. Lever. t. 9. —

Surinam — ♂, ♀; Brasilien — ♀ — 3 St.

215. 2. N. aethereus Gray

Gen. B. I. p. 46. 5. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 5. 4. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 131. 3. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 184. art. 14. 2 & art. 16. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 7. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 375. 2. — *Caprimulgus aethereus* Wied Reis. Bras. I. p. 236 & II. p. 227. — Id. Beitr. III. p. 303. 2. — *Caprimulgus longicaudatus* Spix Av. Bras. II. p. 1. t. 1.— Burm. Th. Bras. II. p. 376. Anm. — *Nyctibius longicaudatus* Lafr. Mag. Z. 1837. Ois. p. 25. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 184. art. 14. 3 & art. 16.— Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 7. 3. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Subfam. STEATORNITHINÆ. Fettvögel.

Gen. STEATORNIS Humboldt 1833. — Guacharo.

Caprimulgus Humboldt 1800 (nec Lin. 1748). *Nyctibius* Steph. 182? (nec Vieill. 1816).

216. 1. **S. caripensis Humboldt**

Obs. Z. II. p. 141. t. 44. — Id. Nouv. Ann. Mus. Paris. 1834. p. 321. t. 15. — Gray List Gen. B. p. 7. — Id. Gen. B. I. p. 44. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 1. 1.— Bp. Consp. I. p. 57. gen. 127. — Cassin Proc. Acad Nat. Sc. Philad. 1851. p. 190. art. 26. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 6. 1.— Scl. B. Bogot. p. 7. 17. — *Caprimulgus steatornis* Humboldt Journ. Phys. (1800) p. . . . . — *Nyctibius steatornis* Steph. Gen. Z. XIII. p. 91. —

Cumana — ♂ — 1 St.

TRIBUS II. AMPHIBOLÆ. WENDEZEHER.

Fam. COLIIDÆ. Mausvögel.

Gen. COLIUS Briss. 1760. — Mausvogel.

Urocolius & *Rhabdocolius* Bp. 1854.

217. 1. C. capensis Gm.

S. N. p. 842. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 368. 1. — Vieill. Enc. p. 864. 1. — Gray List Gen. B. p. 64. — Id. Gen. B. II. p. 393. 1. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 1. — *Loxia colius* Lin. S. N. p. 301. 12. — *Coliou du Cap de bonne espérance* Buff. Pl. enl. 282. 1. — *Colius erythropus* Gm. S. N. p. 842. 3. — Gray Gen. B II. p. 393. 2. — *Colius leuconotus* Lath. Ind. Orn. I. p. 369. 3. — Less. Trait. Orn. p. 453. 2. — *Colius erythropygius* Vieill. N. D. VII. p. 377. — Id. Enc. p. 864. 2. —

Süd-Africa — ♂ — 2 St.

218. 2. C. striatus Gm.

S. N. p. 843. 4. — Lath. Ind. Orn. I. p. 369. 4. — Vieill. Enc. p. 865. 7. — Less. Trait. Orn. p. 453. 3. — Gray Gen. B. II. p. 393. 5. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 70. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 605. 889. — *Coliou de l'isle de Panay* (!) Sonn. Voy. Nouv.-Guin. p. 116. t. 74. — *Colius panayensis* (!) Gm. S. N. p. 483. 5. — Lath. Ind. Orn. I. p. 369. 5. — *Tanagra macroura* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr. p. . . . — *Rhabdocolius striatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. —

Kafferland — ♂, ♀; Cap — ♂, ♀ — 4 St.

219. 3. C. macrurus Gray

Gen. B. II. p. 393. 3. t. 96. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B.

p. 70. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 606. 890. — *Lanius macrurus* Lin. S. N. p. 134. — *Coliou huppé du Sénégal* Buff. Pl. enl. 282. 2. — *Colius senegalensis* Gm. S. N. p. 842. 2. — Lath. Ind. Orn. I. p. 368. 2. — Vieill. Enc. p. 865. 4, — Id. Gal. Ois. II. p. 54. t. 51. — Less. Trait. Orn. p. 453. 1. — Rüpp. Orn. Misc. p. 44.— Id.Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 79. 318. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 2. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 123. 376. — Id. Orn. Westafr. p. 155. 471. — *Urocolius macrourus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. 59. —

Sennaar — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 4 St.

220. 4. C. erythromelas Vieill.

N. D. VII. p. 378.— Id. Enc. p. 865. 6.— Gray Gen. B. II. p. 393. 4. — *Colius indicus* (!) Lath. Ind. Orn. I. p. 370. 7. — Gray Gen. B. II. p. 393. 8. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 3. — *Colius carunculatus* Steph. Gen. Zool. — *Colius quiriva* Less. — *Colius coromandeliensis* „Licht." Gray Gen. B. III. App. p. 18.— Levaill. Ois. Afr. t. 258.— *Urocolius indicus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. 60. —

Süd-Africa — 2 ♂, ♀ — 3 St.

221. 5. C. leucotis Rüpp.

Mus. Senckenberg. III. t. 2. 1.—Id. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 79. 319. — Gray Gen. B. II. p. 393. 7. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 6. — *Rhabdocolius leucotis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. 64. —

Abyssinien — ♂ — 2 St.



Fam. MUSOPHAGIDÆ. Pisangfresser.

Gen. CORYTHAÏX Ill. 1811. — Trägvogel.

Turacus (!) Cuv. 1799—1800. *Touraco* (!) Lacép. 1800—1. *Opoethus* (!) Vieill. 1816. *Musophaga* Temm. 1820 (nec Isert. 1789). *Opaethus* Vig. 1825. *Spelectos* Wagl. (!) 1827. *Spelectus* Id. 1830. *Opaetus* (!) Vieill. 1834. *Gallirex* Less. 1844. *Spelectes* (!) Gray 1845. *Spelectis* (!) Bp. 1854.

222. 1. C. albocristatus Nob.

Touraco de Guinée (!) Buff. Pl. enl. 601. — *Touraco Loury* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guêp. III. p. 29. t. 16. — *Opaethus persa* Vieill. (nec Lin.) Enc. p. 1297. 2. — *Musophaga persa* Licht. (nec Lin.) Doubl. p. 7. 26. — *Corythaïx persa* Less. (nec Lin.) Trait. Orn. p. 123. 1. — *Spelectos corythaix* Wagl. Syst. Av. p. 116. 1. — *Turacus albocristatus* „Strickl." Gray Gen. B. II. p. 395. 3. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 2. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 604. 885. —
Cap — ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ ad. — 4 St.

223 2. C. Buffoni Jard. & Selby

Ill. Orn. III. t. 122. — Hartl. Orn. Westafr. p. 156. 475. — *Touraco Buffon* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guêp. III. p. 33. t. 7. — *Opaethus Buffonii* Vieill. N. D. XXXIV. p. 304.— Id. Enc. p. 1297. 1. — *Corythaïx purpureus* „Cuv." Less. Trait. Orn. p. 124. 2. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 125. 380. — Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 159. 12. — *Spelectos persa* Wagl. (nec Lin.) Syst. Av. p. 116. 2. — *Corythaïx senegalensis* Sws. B. W.-Afr. I. p. 225. t. 21. — *Turacus purpureus* Gray Gen. B. II. p. 395. 2. — *Turacus persa pt.* Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 1. — *Turacus purpureus* „Bp." Verr. R. & Mag. Z. 1851. p. 258. — Puch. l. l. 1852. p. 473. —
Guinea — ♂ — 2 St.

224. 3. C. leucotis Rüpp.

Faun. Abyss. Av. p. 8. t. 3. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 23. 53. — *Turacus leucotis* Rüpp. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 80. 326. — Gray Gen. B. II. p. 395. 5. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 604. 886. —

Abyssinien — ♂ — 2 St.

225. 4. C. porphyreolophus Nob.

Musophaga porphyreolopha Vig. Proc. Zool. Soc. 1831. p. 93. — Jard. & Selby Ill. Orn. n. s. t. 46. — *Corythaïx Burchellii* Smith Ill. S.-Afr. Zool. B. t. 35.—*Gallirex Anais* Less. — *Turacus porphyreolophus* Gray Gen. B. II. p. 395. 8. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 7. — *Gallirex porphyreolopha* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 20. 48. —

Port-Natal — ♂ — 1 St.

Gen. Corythaeola Heine 1860. — Helmvogel.

Crax Griff. 18?? (nec Lin. 1744). *Phimus* Sundev. 1849 (nec Wagl. 1827). *Gallirex* Bp. 1854 (nec Less. 1844). *Turacus* Hartl. 1854 (nec Cuv. 1799 — 1800). *Chizaerhis* (!) Gray 1855 (nec Wagl. 1827).

226. 1. C. cristata Heine

Journ. Orn. 1860. p. 190. — *Touraco géant* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guêp. III. p. 36. t. 19. — *Musophaga cristata* Vieill. Analys. p. 68. — *Musophaga gigantea* Id. N. D. XXII. p. 91. — Id. Enc. p. 1295. 2. — Less. Trait. Orn. p. 125. 2.— *Crax cyanea* „J. E. Gray“ Griff. Anim. Kingd. B. III. t. . . . — *Chizaerhis gigantea* Wagl. Syst. Av. p. 113. 1. — *Corythaïx gigas* Steph. Gen. Zool. p. . . . — *Gallirex giganteus* Less. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 20. 46. — *Turacus giganteus* Gray Gen. B. II. p. 395. 7. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 6. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 125. 382. — Id. Orn. Westafr. p. 159. 479. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859. p. 139. 158. — Heine Journ. Orn. 1860. p. 190. 156. — *Phimus giganteus* Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 160. 14. —

Goldküste — ♂ — 1 St.

Gen. Musophaga *) Isert. 1789. — Pisangfresser.

Cuculus Shaw 18?? (nec Lin. 1735). *Phimus* Wagl. 1827.

227. 1. M. violacea Isert.

Schrift. Berlin. Gesellsch. IX. p. 16. t. 1.— Ill. Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 203. gen. 8.— Vieill. N. D. XXII. p. 90.— Id. Enc. p. 1295. 1. — Id. Gal. Ois. II. p. 43. t. 47. — Gray Gen. B. II. p. 394. — Bp. Consp. I. p. 87. geu. 207. 1. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 126. 383. — Id. Orn. Westafr. p. 159. 480. — *Touraco violet ou masqué* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guêp. III. p. 34. t. 18. — *Cuculus regius* Shaw Mus. Lever. p. 167. t. 40. — *Phimus violaceus* Wagl. Syst. Av. p. 114. 1. — *Musophaga violacea* Sws. B. W.-Afr. I. p. 218. t. 19. —

Senegambien — ♂ — 2 St.

Gen. Schizorhis Wagl. 1829. — Bananenfresser.

Chizaerhis (!) Wagl. 1827. *Corythaïxoïdes* (!) Smith 1830. *Coliphimus* (!) Id. 1836. *Colophimus* (!) & *Chizaeris* (!) Agass. 1848. *Schizhoris* (!) Bp. 1849. *Schizorrhis* Id. 1854.

228. 1. S. africana Gray

List Gen. B. p. 64. — Id. Gen. B. II. p. 395. 1. — Bp. Consp. I. p. 88. gen. 209. 1. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 126. 385. — Id. Orn. Westafr. p. 160. 482. — *Phasianus africanus* Lath. Ind. Orn. II. p. 631. 8. — *Touraco musophage* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guêp. III. p. 37. t. 20.— *Musophaga variegata* Vieill. N. D. XXII. p. 92. — Id. Enc. p. 1296. 3. — Id. Gal. Ois. II. p. 44. t. 48. — *Musophaga senegalensis* Licht. Doubl. p. 7. 26. — *Chizaerhis variegata* Wagl. Syst. Av. p. 113. 2. — Sws. B. W.-Afr. I. p. 223. t. 20. — *Schizorrhis africana* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 25. 58. —

Senegambien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

---

*) Als zweite Art soll hierher gehören die bisjetzt nur in einem Exemplare vorhandene: *M. Rossae* Gould Contrib. Orn. 1851. p. 137. t. 81. — Id. Ann. & Mag. N. H. 1853. p. 154. — Id. P. Z. S. 1854. p. 23. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 126. 384. — Gould Ann. & Mag. N. H. 1855. p. 381. — Hartl. Orn. Westafr. p. 160. 481. —

229. 2. S. zonura Rüpp.

Neue Wirbelth. t. 4. — Id. Syst. Ueb. Vög. N.-O.-Afr. p. 80. 327. — *Schizorhis zonarius* Gray Gen. B. II. p. 395. 2. — *Chizaerhis zonurus* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 209. 2. —

Abyssinien — ♂ — 1 St.

230. 3. S. concolor Gray

Gen. B. II. p. 395. 5. — Bp. Consp. I. p. 88. gen. 209. 5. — *Corythaïxoïdes concolor* Smith Rep. S.-Afr. Exped. App. p. . . . . . . — — *Chizaerhis Feliciae* Less. — *Coliphimus concolor* Smith.

Cap — ♂ — 2 St.

Fam. OPISTHOCOMIDÆ. Schopfhühner.

Gen. Opisthocomus „Hoffm." Ill. 1811. — Schopfhuhn.

Orthocorys Vieill. 1816. *Sasa* (!) Id. 1818. *Oposthocomus* (err.) Cab. 1848.

231. 1. **O. cristatus Ill.**

Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 239. gen. 72. — Cuv. Règn. Anim. II. p. 472. — Less. Trait. Orn. p. 127. — Gray Gen. B. II. p. 396. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 712. 212. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 44. — Burm. Th. Bras. III. p. 342. — *Faisan huppé de Cayenne* Buff. Pl. enl. 337. — *Phasianus cristatus* Gm. S. N. p. 741. 10. — Lath. Ind. Orn. II. p. 631. 7. — *Sasa cristata* Vieill. Gal. Ois. II. p. 326. t. 193. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

Schnellpressendruck von J. Hörling's Wittwe in Halberstadt.

Index generum.

Die erste Zahl bedeutet den Theil, die zweite die Seitenzahl.

B.

D.

E.

F.

G.

N.

O.

Index specierum.

Die erste Zahl bedeutet den Theil, die zweite die Seitenzahl, die dritte die laufende Species - Nummer.

B.

H.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

Druckfehler und Berichtigungen.

Pars II.

Seite.
78, Zeile 23 v. oben lies: Nr. 256 statt 257.
149, Zeile 18 v. oben lies: Bp. statt Nob.
161, Zeile 10 v. unten lies: *Krabbenliest* statt *Stummelliest.*

Pars III.

Seite.
6, Zeile 12—23 v. oben: Genus *Dolerisca* und Nr. 5 etc. ist gänzlich zu streichen, *D. fallax* besitzt überhaupt die Sammlung noch gar nicht, und wurde diese Art nur irrthümlich als vorhanden aufgezählt.
6, Zeile 11 v. oben lies: *Cayenne* — ♂, ♀ — 4 St. statt ♀ — 3 St.
7, „ 9 v. unten ist hinter *atrimentalis* zu setzen: Lawrence.
33, „ 11 v. oben lies: 2 ♂, ♀ — 3 St. statt ♂, ♀ — 2 St.
41, „ 11 v. unten lies: 3 St. statt 2 St.
54, „ 19 v. unten lies: 2 ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 4 St. statt ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 3 St.
„ „ 1 v. unten: wir gaben Venezuela als Vaterland unseres *Heliomaster Sclateri* gestützt auf mehrere sicher von dort gesandte Exemplare des berliner Museum's, wollen jedoch nicht verschweigen, dass unsere beiden Vögel, nach Warscewicz's eigener Angabe in Veragua gesammelt sein sollen.
67, „ 1 v. oben lies: *Steganurus remiger* statt *remigera.*
104, Spalte 2, Zeile 19 v. unten lies: *Boscis* statt *Borcis.*
107, „ 2, „ 6 v. oben lies: *Culicivora* statt —.
„ „ „ „ 7 v. oben lies: — statt *Culicivora.*
112, „ 1, „ 20 v. unten ist zu streichen.
„ „ „ „ 14 v. unten lies: *Malaconotus* statt *Melaconotus.*
„ „ 2, „ 1 v. unten lies: *Mniotilta* statt *Miniotilta.*
113, „ „ „ 25 v. unten lies: *Nyctornis* statt *Nyctyornis.*
117, „ 1, „ 21 v. oben lies: *Schizorhis* statt *Schirorhis.*
133, „ „ „ 3 v. oben lies: *icteronotus* statt *icterronotus.*
154, „ „ „ 9 v. oben lies: Licht. statt Licht.

Schnellpressendruck bei J. Hörling's Wittwe in Halberstadt.





Druck von J. Hörling's Wittwe in Halberstadt.






3 2044 106 206 204

